

4 > Artenliste mit Gefährdungskategorien

Erklärungen zur Artenliste

Name Wissenschaftlicher Name

Kat. Gefährdungsstatus nach IUCN (2001)

RE in der Schweiz ausgestorben

CR vom Aussterben bedroht

EN stark gefährdet

VU verletzlich

NT potenziell gefährdet

LC nicht gefährdet (vgl. www.swissfungi.ch)

DD ungenügende Datengrundlage (vgl. www.swissfungi.ch)

IUCN Verwendete Kriterien der IUCN (siehe Kapitel A3)

A Abnahme der Populationsgrösse

B Geografische Verbreitung

C Kleine Populationsgrösse

D Sehr kleine Populationsgrösse

Bsp. *Boletus aereus* B1ab(iii) + D1:

Das geschätzte Verbreitungsgebiet (B1) ist kleiner als 20'000 km² und fragmentiert (a), ein Rückgang wird abgeleitet (biii) aus der Tatsache, dass die Standorte im Mittelland einem hohen Stickstoffeintrag unterstehen; zudem ist die Art selten und die Gesamtpopulation (D1) wird auf unter 1000 Individuen geschätzt.

NHV Schutzstatus gemäss Bundesverordnung zum Natur- und Heimatschutzgesetz (SR 451.1)

§^{CH} Schweizweit geschützt

Tab. 3 > Artenliste mit Gefährdungskategorien.

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Abortiporus biennis</i> (Bull.: Fr.) Singer	Rötender Saftwirrling	VU	B1ab(iv)		
<i>Agaricus altipes</i> (F.H. Moeller) Pilat	Langstieliger Stink-Egerling	EN	D1		
<i>Agaricus benesii</i> Pilat	Rötender Riesenchampignon	VU	D1		
<i>Agaricus comtulus</i> Fr.	Wiesen-Zwergchampignon	NT			in Wiesen
<i>Agaricus excellens</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Schneeweißer Riesenchampignon	VU	D1		
<i>Agaricus lanipes</i> (F.H. Moeller et Jul. Schaeff.) Singer	Wollfuß-Champignon	VU	D1		
<i>Agaricus leucotrichus</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Weißhaariger Anis-Champignon	EN	D1		
<i>Agaricus luteomaculatus</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Ockerbrauner Zwerg-Champignon	VU	D1		
<i>Agaricus lutosus</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Ockerfarbener Zwerg-Egerling	EN	B1ab(iii)		Grasland-Art
<i>Agaricus macrocarpus</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Großer Anis-Champignon	VU	D1		
<i>Agaricus maleolens</i> F.H. Moeller	Übelriechender Champignon	VU	D1		in Gärten, Parks, Nadelstreu
<i>Agaricus nivescens</i> (F.H. Moeller) F.H. Moeller	Schneeweißer Champignon	VU	B1ab(iv,iii)		Grasland
<i>Agaricus porphyrizon</i> P.D. Orton	Purpurfarbiger Champignon	VU	D1		auch Parkanlagen
<i>Agaricus subperonatus</i> (J.E. Lange) Singer	Gegürtelter Champignon	EN	B1ab(iii,iv)		in Trockenwiesen und schwach gedüngtem Grasland
<i>Agaricus vaporarius</i> (Pers.) Cappelli	Kompost-Champignon	NT			Grasland, ruderales Standorte
<i>Agrocybe elatella</i> (P. Karst.) Vesterholt	Sumpfwiesen-Ackerling	VU	B1ab(iii,iv)		Sümpfe
<i>Agrocybe firma</i> (Peck) Kuehner	Samtiger Ackerling	VU	D1		
<i>Agrocybe vervacti</i> (Fr.: Fr.) Singer	Hohlstieliger Ackerling	VU	D1		Aecker, Grasland
<i>Aleurocystidiellum disciformis</i> (DC.: Fr.) Telleria	Schüsselförmige Mehlscheibe	NT			
<i>Aleurocystidiellum subcruentatum</i> (Berk. et M.A. Curtis) P.A. Lemke	Skelettzystiden-Mehlscheibenpilz	CR	D1		
<i>Aleurodiscus amorphus</i> (Pers.: Fr.) J. Schroet.	Orangefarbene Mehlscheibe	VU	B1ab(iv)		
<i>Aleurodiscus aurantius</i> (Pers.: Fr.) J. Schroet.	goldorange Mehlscheibe	VU	D1		
<i>Amanita beckeri</i> Huijsman	Hellflockiger Scheidenstreifling	EN	B1ab(iii)+D1		im Laubwald
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.: Fr.) Pers.	Kaiserling	VU	B1ab(ii,iii,iv)+B2ab(iii)		
<i>Amanita eliae</i> Quel.	Kammrandiger Wulstling	VU	B1ab(iii)		
<i>Amanita franchetii</i> (Boud.) Fayod	Rauher Wulstling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Amanita friabilis</i> (P. Karst.) Bas	Erlen-Scheidenstreifling	EN	B1ab(iii,iv)		Grauerlenwald
<i>Amanita gemmata</i> (Fr.) Bertillon	Narzissengelber Wulstling	NT			
<i>Amanita lividopallescens</i> (Gillet) Seyot	Ockergrauer Scheidenstreifling	VU	B1ab(iii)+B2ab(ii)		
<i>Amanita magnivolvata</i> Aalton	Grossscheidiger Scheidenstreifling	VU	B1ab(iii)+B2ab(iii)		nur in Westschweiz!
<i>Amanita mairei</i> Foley	Silberweißer Scheidenstreifling	NT			
<i>Amanita nivalis</i> Grev.	Alpiner Scheidenstreifling	VU	D1		alpine Art
<i>Amanita pachyvoluta</i> (Bon) Krieglsteiner	Dickscheidiger Wulstling	VU	D1		
<i>Amanita solitaria</i> (Bull.:Fr.) Merat	Stachelschuppiger Wulstling	VU	B1ab(iii)		
<i>Amanita verna</i> (Bull.) Pers.	Frühlings-Knollenblätterpilz	VU	B1ab(iii,iv)+B2ab(iii,iv)		
<i>Amyloporiella crassa</i> (P. Karst.) A. David et Tortic	Dickliche Braunfäuletramete	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D2		keine rezente Funde!
<i>Amylostereum areolatum</i> (Fr.) Boidin	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz	NT			

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Amylostereum laevigatum</i> (Fr.: Fr.) Boidin	Wacholder-Schichtpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Anellaria phalaenarum</i> Bull.: Fr.	Schmieriger Düngerling	NT			
<i>Anthracobia maurilabra</i> (Cooke) Boud.	Düsterer Brandstellenbecherling	NT			
<i>Antrodia albida</i> (Fr.:Fr.) Donk	Weißliche Tramete	VU	B1ab(iv)		
<i>Antrodia lenis</i> (Karst.) Ryvarden	Rosafleckende Braunfäuletramete	EN	D1		
<i>Antrodia malicola</i> (Berk. et M.A. Curtis) Donk	Apfelbaum-Resupinatporling	EN	B1ab(iv)		
<i>Antrodia ramentacea</i> (Berk. et Broome) Donk	Knospen-Tramete	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Antrodia sinuosa</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Wellige Braunfäule-Tramete	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Antrodiella semisupina</i> (Berk. et M.A. Curtis) Ryvarden et I. Johans.	Knorpelige Tramete	VU	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Arcangiella borziana</i> Cavara	Braunrote Milchtrüffel	NT			
<i>Arcangiella stephensii</i> (Berk.) Zeller et B.O. Dodge	Fastgestielte Milchtrüffel	VU	D1		
<i>Armillaria ectypa</i> (Fr.: Fr.) Lamoure	Moor-Hallimasch	RE			letzte Fundmeldung 1935
<i>Arrhenia retirugis</i> (Bull.: Fr.) Redhead	Netziger Adermoosling	NT			
<i>Arrhenia roseola</i> (Quel.) Senn-Irllet	Rosa-Adermoosling	EN	D1		im Weidegebiet an Erdanrissen
<i>Ascozonus woolhopensis</i> (Berk. et Broome) Boud.	Dung-Haarbecherchen	VU	D1		
<i>Asterostroma cervicolor</i> (Berk. et M.A. Curtis) Masseur	Ockerfarbener Sternsetenpilz	VU	D2		
<i>Asterostroma laxum</i> Bres.	Glattsporiger Sternsetenpilz	EN	D1		
<i>Astraeus hygrometricus</i> (Pers.) Morgan	Wetterstern	VU	D1		eine Art der Südschweiz
<i>Aurantioporus fissilis</i> (Berk. et M.A. Curtis) H. Jahn	Apfelbaum-Weichporling	VU	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		
<i>Bankera fuligineoalba</i> (Schmidt: Fr.) Pouzar	Schmutziger Stacheling	EN	B1ab(iii,iv)		bei Föhren
<i>Bankera violascens</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar	Violettlicher Stacheling	VU	B1ab(iii)+D1		
<i>Basiodendron cinereum</i> (Bres.) Luck-Allen	graue Wachsrinde	VU	D1		
<i>Biscogniauxia marginata</i> (Fr.: Fr.) Pouz	Berandeter Rindenkugelpilz	VU	Bab(iii) + D1		an Holz von Mehlbeeren (<i>Sorbus</i>)
<i>Boidinia furfuracea</i> (Bres.) Stalpers et Hjortstam	Kleiiger Gloeozystidenrindenpilz	VU	D1		
<i>Boidinia subasperisporum</i> (Litsch.) Juelich	feinwarziger Flockenschwamm	VU	D1		
<i>Bolbitius pluteoides</i> M.M.Moser	Dachpilzartiger Mistpilz	EN	B1ab(iv)+D1		adventiv?
<i>Boletopsis grisea</i> (Peck) Bondartsev et Singer	Bitterer Russporling	EN	B1ab(iv)		vor allem in den Südalpen, bis in die subalpine Stufe
<i>Boletopsis leucomelaena</i> (Pers.) Fayod	Grauer Rußporling	NT			
<i>Boletus aereus</i> Bull.: Fr.	Bronze-Röhrling	VU	B1ab(iii)+D1		
<i>Boletus depilatus</i> G. Redeuilh	Gefleckthütiger Röhrling	NT			
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	Dupains Hexenröhrling	EN	B1ab(iii)+D1		bei Eichen
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	Sommer-Röhrling, Silber-Röhrling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	Fahler Röhrling	VU	B1ab(iii,iv)+D1		
<i>Boletus junquilleus</i> (Quel.) Boud.	Zweifarbiger Hexenröhrling	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Boletus pseudoregius</i> Hubert ex Estades	Blauer Königsröhrling	EN	B1ab(iii,iv)+D1		bei Eichen und Buchen
<i>Boletus queletii</i> Schulz.	Glattstieliger Hexenröhrling	VU	B1ab(iii)		
<i>Boletus regius</i> Krombh.	Königs-Röhrling	EN	B1ab(iii,iv)+D1	§ ^{CH}	bei Eichen, Buchen und Kastanien
<i>Boletus rhodopurpureus</i> Smotl.	Weinroter Röhrling	VU	B1ab(iii)+D1		wieso nicht im Mittelland?
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	Rosahütiger Purpur-Röhrling	VU	C2a(i)		
<i>Boletus satanas</i> Lenz	Satanspilz	NT			

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Boletus splendidus</i> G.W. Martin	Mosers Satansröhrling	NT			eher seltene Art, aber verbreitet
<i>Boletus subappendiculatus</i> Dermek et Lazebn. et Ves.	Falscher Anhängselröhrling	NT			seltene Art, wenig Individuen
<i>Boletus torosus</i> Fr.	Ochsen-Röhrling	EN	B1ab(iii,iv)		bei Buchen
<i>Bondarzewia mesenterica</i> (Schaeff.) Kreisel	Bergporling	NT			
<i>Botryotinia calthae</i> Hennebert et Elliot ap. Hennebert et Groves	Sumpfdotterblumen-Becherling	EN	D1		an Sumpfdotterblumen
<i>Botryotinia ranunculi</i> Hennebert et Groves	Hahnenfuß-Sklerotienbecherling	EN	D1		
<i>Bovista limosa</i> Rostr.	Kleinster Bovist	EN	B1ab(iii,iv)		sandig-kiesiger Boden
<i>Bovista paludosa</i> Lev.	Moor-Bovist	EN	B1ab(iii)		Hoch- und Flachmoore, Bachränder
<i>Bovista pusilla</i> (Batsch: Pers.) Pers.	Zwerg-Bovist	EN	B1ab(iv)		sandige, offene Standorte
<i>Bovista tomentosa</i> (Vittad.) Quel.	Filziger Bovist	EN	B1ab(ii,iii,iv)		sandig-offene Standorte, Trockenrasen und Gletschervorfelder
<i>Byssonectria fusispora</i> (Berk.) Rogerson et Korf	Spindelsporiger Becherling	NT			auch an Brandstellen
<i>Byssonectria terrestris</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Pfister	Erdbewohnender Filzpustelpilz	EN	D1		übersehen?
<i>Calocybe obscurissima</i> (Pearson) M.M. Moser	Umberbrauner Schönkopf	VU	D1		
<i>Calocybe onychina</i> (Fr.) Donk	Purpurbrauner Schönkopf	VU	D1		
<i>Caloscypha fulgens</i> (Pers.) Boud.	Leuchtender Prachtbecher	VU	B1ab(iv)		Frühjahrespilz
<i>Calycellina ulmariae</i> (Lasch in Rabh.) Korf	Spierstauden-Kurzhaarbecher	NT			
<i>Camarophyllopsis atropuncta</i> (Pers.: Fr.) Arnolds	Punktierstieler Samtschneckling	CR	D1		
<i>Camarophyllopsis foetens</i> (W. Phillips) Arnolds	Stinkender Samtschneckling	CR	D1		
<i>Camarophyllopsis micacea</i> (Berk. et Broome) Arnolds	Goldbrauner Samtschneckling	CR	D1		
<i>Camarophyllopsis phaeophylla</i> (Romagn.) Arnolds	Braunblättriger Samtschneckling	CR	D1		
<i>Camarophyllopsis schulzeri</i> (Bres.) Herink	Graubrauner Samtschneckling	CR	D1		
<i>Camarophyllus berkeleyanus</i> Clemencon	Blasser Wiesenellerling	EN	D1		Grasland
<i>Camarophyllus cinereus</i> (Fr.) Karst.	Ganzgrauer Ellerling	EN	B1ab(iii)		Grasland
<i>Camarophyllus flavipes</i> (Britzelm.) Clemencon	Gelbfüßiger Ellerling	VU	D2		
<i>Camarophyllus fuscescens</i> (Bres.) M.M. Moser	Bräunlicher Ellerling	VU	B1ab(iii,iv)		Grasland, aus dem Mittelland verschwunden
<i>Camarophyllus lacmus</i> (Schum.) J.E. Lange	Gelbfüßiger Ellerling	VU	B1ab(iv)		
<i>Camarophyllus russocoriaceus</i> (Berk. et Mill.) J.E. Lange	Juchten-Ellerling	VU	B1ab(iv)		Grasland
<i>Candelabrochaete septocystidia</i> (Burt) Burds.	Kandelaber-Septozystidenpilz	EN	D1		nur aus dem Tessin bekannt, an Linden- und Weidenholz
<i>Cantharellula umbonata</i> (Gmel.: Fr.) Singer	Rötender Gabeling	VU	D1		subalpine Stufe, Voralpen
<i>Cantharellus ianthinoxanthus</i> Maire	Schwärzender Pfifferling	EN	D1		Buchenwald
<i>Cantharellus melanoxeros</i> Desm.	Schwärzender Pfifferling	VU	B1ab(iii)		
<i>Ceraceomyces sublaevis</i> (Bres.) Juelich	Kleinsporiger Wachsrindenpilz	NT			
<i>Ceriporiopsis gilvescens</i> (Bres.) Domanski	Fleckender Harzporling	EN	D1		Laubholz
<i>Ceriporiopsis resinascens</i> (Romell) Domanski	Harziger Wachs-Porling	EN	D1		Laubholz
<i>Chalciporus amarellus</i> (Quel.) M.M. Moser	Bitterlicher Röhrling	VU	B1av(iii,iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Chalciporus pseudorubinus</i> (Thirring) Pilat et Dermek	Kleinster Zwergröhrling	CR	D1		
<i>Chamonixia caespitosa</i> (Rolland) Fischer	Blaunuß	EN	D1		im Fichtenwald
<i>Cheilymenia theleboloides</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Boud.	Blaßgelber Erdborstling	VU	B1ab(iv)+D1		
<i>Cheilymenia vitellina</i> (Pers.) Dennis	Dottergelber Erdborstling	VU	D1		
<i>Choironomyces maeandriiformis</i> Vittad.	Weißer Mäandertrüffel	NT			
<i>Ciboria viridifusca</i> (Fuckel) Hoehn.	Erlenzäpfchen-Becherling	EN	D1		an Erlenzäpfchen
<i>Claussenomyces prasinulus</i> (P.Karsten) Korf et Abawi	Lauchgrünes Gallertbecherchen	NT			
<i>Clavaria argillacea</i> Pers.: Fr.	Gelbstielige Keule	EN	D1		«auf Heideböden», Standorte vom Verschwinden bedroht
<i>Clavaria candida</i> Weinm. (ss. Quel.)	Sternsporige Keule	EN	D1		wohl öfters mit <i>C. asterospora</i> = <i>C. falcata</i> verwechselt
<i>Clavaria fumosa</i> Fr.	Rauchgraue Keule	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Clavaria incarnata</i> Weinm.	Fleischfarbene Keule	EN	D1		Grasland und grasige Wälder
<i>Clavaria rosea</i> Fr.	Rosafarbige Koralle	CR	D1		
<i>Clavaria zollingeri</i> Lev.	Zollingscher Korallenpilz	EN	B1ab(ii,iii)	§ ^{CH}	Grasland
<i>Clavicornia pyxidata</i> (Pers.: Fr.) Doty	Becherkoralle	VU	D1		
<i>Clavulicium macounii</i> (Burt) J. Erikss. et Boidin	Macouns Rindenpilz	EN	D1		an Nadelholz
<i>Clavulina amethystina</i> (Fr.) Donk	Violette Koralle	EN	B1ab(iv)		Grasland und grasiger Wald
<i>Clavulinopsis corniculata</i> (Schaeff.: Fr.) Corner	Gelbe Wiesenkoralle	NT			Grasland-Art!
<i>Clavulinopsis fusiformis</i> (Sowerby: Fr.) Corner	Spindelförmige Wiesenkeule	VU	B1ab(iii,iv)		Voralpenpilz, früher wohl häufiger
<i>Clavulinopsis helveola</i> (Pers.: Fr.) Corner	Goldgelbe Wiesenkeule	NT			
<i>Clavulinopsis luteoalba</i> (Rea) Corner	Gelbweisses Keulchen	EN	D1		Feuchtwiesen
<i>Clitocybe barbularum</i> (Romagn.) P.D. Orton	Dünen-Nabeling	EN	B1ab(ii,iii)		sandige Trockenrasen
<i>Clitocybe bresadolana</i> Singer (non ss. Einhell.)	Heidetrichterling	VU	B1ab(iii)		auch alpine Art
<i>Clitocybe collina</i> (Velen.) Klan	Hügel-Trichterling	CR	D1		Trockenrasenart
<i>Clitocybe elegantula</i> J. Favre	Eleganter Trichterling	EN	D1		
<i>Clitocybe ericetorum</i> (Bull.: Fr.) Quel. ss. Bres., J.E. Lange	Heide-Trichterling	EN	B1ab(iii,iv)		Grasland
<i>Clitocybe favrei</i> Kuehner et Romagn.	Favre' Trichterling	EN	D1		in Hochmooren
<i>Clitocybe festiva</i> J. Favre	Wachsbleicher Trichterling	VU	D1		alpine Art
<i>Clitocybe fuliginipes</i> Metrod	Starrer Trichterling	VU	D1		
<i>Clitocybe glareosa</i> Roellin et Monthoux	Kiesliebender Trichterling	EN	B1ab(ii,iii)		in Trockenrasen
<i>Clitocybe lateritia</i> J. Favre	Ziegelroter Trichterling	EN	D1		alpin, auf Kalkböden
<i>Clitocybe lituus</i> (Fr.) Metrod	Faserstieler Trichterling	EN	D1		
<i>Clitocybe marginella</i> Harmaja	Zweifarbiger Trichterling	VU	D1		
<i>Clitocybe martiorum</i> J. Favre	Fälblings-Rötlertrichterling	EN	D1		typische Art des Mittelandes
<i>Clitocybe maxima</i> (Fl.Wett.ex Fr.) P. Kumm.	Riesen-Trichterling	VU	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Clitocybe pseudoobbata</i> (J.E. Lange) Kuyper	Graubraunlicher Trichterling	EN	B1ab(ii,iii)		sandige Böden
<i>Clitocybe subsalmonea</i> Lamoure	Rosabrauner Trichterling	VU	D2		
<i>Clitocybe truncicola</i> (Peck.) Sacc.	Weisser Holz-Trichterling	EN	D1		an Laubholz
<i>Clitocybe tuba</i> (Fr.) Gillet ss.Ricken	Trompeten-Trichterling	EN	D1		
<i>Clitocybula abundans</i> (Peck) Singer	Üppiger Rübbling	CR	A1a		letzte Fundmeldung 1980

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Collybia acervata</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm	Rotstieliger Rübbling	NT			
<i>Collybia fodiens</i> (Kalchbr.) J. Favre	Durchbohrter Rübbling	VU	D1		Eventuell verkannt
<i>Collybia hybrida</i> (Kuehner et Romagn.) Svrcek et Kubicka	Zimtbrauner Rübbling	VU	D1		selten
<i>Collybia nivalis</i> (Luethi et Plomb) M.M. Moser	Schneerübbling	EN	D1		Frühlingspilz
<i>Collybia oreadoides</i> (Passer.) P.D. Orton	Heller Büschel-Rübbling	VU	D1		
<i>Collybia proluxa</i> (Hornem.: Fr.) Gillet (non ss. Ricken)	Kerblättriger Rübbling	VU	D1		unter Erlen
<i>Conocybe antipus</i> (Lasch) Kuehner	Spindeliges Samthäubchen	VU	D1		gedüngte Standorte, Kompost, selten
<i>Conocybe aurea</i> (J.Schff.) Kuehner	Gold-Samthäubchen	VU	D1		humus- und nährstoffreiche Stellen, Fettwiesen
<i>Conocybe intrusa</i> (Peck) Singer	Ansehnliches Samthäubchen	VU	D1		Winter bis Frühjahr
<i>Conocybe moseri</i> Watling	Grauschwäzliches Samthäubchen	NT			
<i>Coprinus echinosporus</i> Buller	Warzigsporiger Tintling	VU	D1		
<i>Coprinus latisporus</i> P.D. Orton	Schneeweißes Breitsportintling	VU	D1		Kuhdung und Pferdedung, im Alpenraum
<i>Coprinus martinii</i> J. Favre ex P.D. Orton	Viersporiger Kalyptat-Tintling	CR	D1		
<i>Coprinus narcoticus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Narkotischer Tintling	VU	B1ab(iv)		im Mittelland
<i>Coprinus phaeosporus</i> P. Karst. (non ss. J.E. Lange)	Dunkelsporiger Tintling	CR	A2a		letzter Fund 1988
<i>Coprinus radians</i> (Desm.) Fr.	Strahlfüßiger Tintling	NT			Abnahme?
<i>Coprinus truncorum</i> (Scop.) Fr.ss.Romagn.	Weiden-Tintling	VU	D1		
<i>Cordyceps michiganensis</i> Mains	amerikanische Kernkeule	CR	D1		
<i>Cordyceps sphecocephala</i> (Klotzsch ex Berk.) Berk. et M.A. Curtis	Wespen-Kernkeule	EN	D1		auf toten Wespen
<i>Cortinarius allutus</i> (Secr.) Fr.	Bereifter Schleimkopf	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius amurceus</i> Fr.ex Fr.	Ockergelber Schleimkopf	NT			
<i>Cortinarius arcuatorum</i> R. Hry	Violettgesäumter Klumpfuß	EN	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius argutus</i> Fr. ss.Ricken	Spitzbasiger Dickfuß	EN	D1		Voralpen-Pilz
<i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Geschmückter Gürtelfuß	VU	D1		nährstoffarmes Habitat
<i>Cortinarius arquatus</i> (Fr.) Fr.	Gelbbescheideter Klumpfuß	EN	B1ab(iii,iv)		Fichtenwald
<i>Cortinarius atrovirens</i> Kalchbr.	Schwarzgrüner Klumpfuß	NT			Lebensraum Weisstanne
<i>Cortinarius aureofulvus</i> M.M. Moser	Goldbrauner Klumpfuss	EN	D1		wenige Individuen, nach 1990 lediglich zwei Wiederfunde!
<i>Cortinarius aureopulverulentus</i> M.M. Moser	Goldstaub-Klumpfuß	CR	D1		
<i>Cortinarius avellaneocoeruleus</i> (M.M. Moser) M.M. Moser	Haselnussbrauner Klumpfuss	CR	D1		
<i>Cortinarius azureovelatus</i> P.D. Orton	Blauberandeter Seidenkopf	EN	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius azureus</i> Fr.	Violettblauer Dickfuß	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius balteatoalbus</i> R. Hry	Feinfilziger Schleimkopf	EN	D1		im Nadelwald
<i>Cortinarius balteatocumatilis</i> (R. Hry) ex P.D. Orton	Braunvioletter Schleimkopf	EN	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius betulinus</i> J. Favre	Schmächtiger Birken-Schleimfuss	VU	B1ab(iv)		Moorwald
<i>Cortinarius bulbosus</i> (Sowerby: Fr.) Fr.	Knolliger Gürtelfuß	VU	D1		
<i>Cortinarius bulliardii</i> (Pers. :Fr.) Fr.	Feuerfüßiger Gürtelfuß	VU	B1ab(iii,iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Cortinarius caerulescentium</i> R. Hry	Weissockerlicher Klumpfuss	EN	B1ab(iii)+B2ab(iii)		
<i>Cortinarius caesiocanescens</i> M.M. Moser	Grauer Klumpfuss	VU	B1ab(iii)+B2ab(iii)		
<i>Cortinarius caesiocortinatus</i> Jul. Schaeff.	Rundsporiger Klumpfuß	CR	B1ab(iii)+D1		
<i>Cortinarius caesiocyaneus</i> Britzelm.	Violettlicher Klumpfuss	EN	B2ab(iii)+B1ab(iii)		Buchenwaldart
<i>Cortinarius caesiostamineus</i> R. Hry	Bitterlicher Klumpfuss	EN	B1ab(iii)+D1		Buchenwaldart
<i>Cortinarius causticus</i> Fr.	Bereifter Schleimfuß	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius cephalixus</i> Fr.	Körnigrauer Schleimkopf	VU	B1a(iii)		
<i>Cortinarius cereifolius</i> (M.M. Moser) M.M. Moser	Wachsblättriger Klumpfuss	NT			
<i>Cortinarius cinnabarinus</i> Fr.	Zinnoberroter Hautkopf	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius citrinoolivaceus</i> M.M. Moser	Zitronenoliver Klumpfuss	VU	C2a(i)		
<i>Cortinarius citrinus</i> J.E. Lange ex P.D. Orton	Zitronengelber Klumpfuß	VU	B1ab(iii)+2ab(iii)		
<i>Cortinarius cliduchus</i> Fr.	Gelbgürtelter Schleimkopf	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius corrosus</i> Fr.	Vergrabener Klumpfuß	EN	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius cotoneus</i> Fr.	Olivbrauner Raukopf	VU	B1ab(iii,iv)		Wieso fehlen Funde aus dem Mittelland?
<i>Cortinarius crassus</i> Fr. non Lge, Bres.	Trockener Seidenkopf	EN	B2ab(iv)+B1ab(iv); C2a(i)		Mittellandpopulation für B(iii) nicht berücksichtigt
<i>Cortinarius croceocoeruleus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Safranblauer Schleimfuß	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius croceoconus</i> Fr.	Spitzgebuckelter Safran-Hautkopf	VU	D1		
<i>Cortinarius cumatilis</i> Fr.	Taubenblauer Schleimkopf	VU	B1ab(iii))		
<i>Cortinarius cyaneus</i> (Bres.) M.M. Moser	Dunkelblauer Schleimkopf	VU	B1ab(iii,iv)		Laubwald (Jura)
<i>Cortinarius cyanites</i> Fr.	Rötender Dickfuß	VU	D1		
<i>Cortinarius dibaphus</i> Fr.	Bunter Klumpfuss	EN	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius elegantissimus</i> Rob. Henry	Prächtiger Klumpfuß	VU	B1ab(iii)		Buchenwaldart
<i>Cortinarius emollitus</i> Fr.	Weichstieliger Schleimfuss	VU	D2		
<i>Cortinarius fulmineus</i> (Fr.) Fr.	Fuchsiger Klumpfuß	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius glandicolor</i> Fr.	Schwarzbrauner Gürtelfuß	EN	D1		
<i>Cortinarius guttatus</i> R. Hry	Getropfter Klumpfuß	EN	B1ab(iii)+D1		
<i>Cortinarius haematochelis</i> (Bull. ex Fr.) Fr.	Pupurroter Gürtelfuss	VU	D1		
<i>Cortinarius herpeticus</i> Fr.	Grünvioletter Klumpfuß	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius humicola</i> (Quel.) Maire	Sparriger Raukopf	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius largus</i> Fr.	Blasser Schleimkopf	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius lignicolus</i> Bidaud	Holzbewohnender Raukopf	VU	D1		
<i>Cortinarius lividochraceus</i> (Berk.) Berk.	Langstieliger Schleimfuß	NT			
<i>Cortinarius lividoviolaceus</i> R. Hry	Langstieliger Schleimkopf	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius mairei</i> (M.M. Moser) M.M. Moser	Riechender Klumpfuss	EN	D1		
<i>Cortinarius malachioides</i> P.D. Orton	Hygrophaner Dickfuss	EN	B1ab(iv)		
<i>Cortinarius miniatopus</i> J.E. Lange	Rotfüßiger Gürtelfuss	EN	D1		
<i>Cortinarius moenne-loccozii</i> Bidaud 1993	Scheiden-Klumpfuss	EN	B1ab(iii)+D1		
<i>Cortinarius mucifluus</i> Fr. (non al.)	Kiefern-Schleimfuss	NT			
<i>Cortinarius nemorensis</i> (Fr.) J.E. Lange	Verfärbender Schleimkopf	NT			
<i>Cortinarius olidus</i> J.E. Lange	Gelbgürtelter Schleimkopf	NT			
<i>Cortinarius orellanus</i> (Fr.) Fr.	Orangefuchsiger Raukopf	NT			
<i>Cortinarius papulosus</i> Fr.	Körnigfädiger Schleimkopf	VU	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Cortinarius paracephalix</i> Bohus	Rötender Schleimkopf	VU	D2		
<i>Cortinarius phoeniceus</i> Maire	Rotgenatterter Hautkopf	EN	B1ab(iii,iv)		Vor allem im Tessin
<i>Cortinarius pholideus</i> (Fr.:Fr.) Fr.	Braunschuppiger Dickfuß	VU	B1ab(iv)		
<i>Cortinarius phrygianus</i> (Fr.) Fr.	Hallimasch-Rauhkopf	CR	D1		letzte Fundmeldung 1972
<i>Cortinarius porphyropus</i> (Alb. et Schwein.) Fr.	Purpurfüßiger Schleimkopf	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius prasinus</i> Fr. ss.K. et M.	Lauchgrüner Klumpfuss	EN	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		
<i>Cortinarius psammocephalus</i> Fr.	Kleigschuppiger Gürtelfuß	EN	D1		
<i>Cortinarius pseudocyanites</i> R. Hry	Kaumrötender Dickfuss	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius pseudoglauopus</i> (Jul. Schaeff. ex M.M. Moser) Quadr.	Violettgerandeter Klumpfuss	VU	B2(ii,iii)		Föhrenwald
<i>Cortinarius pseudosulphureus</i> R. Hry ex P.D. Orton	Grünlings-Klumpfuß	VU	B1ab(iii,iv)+D1		
<i>Cortinarius pumilus</i> (Fr.) J.E. Lange	Zwergenhafter Schleimfuss	EN	B1ab(iii)+D1		
<i>Cortinarius rapaceus</i> Fr.	Tonblasser Klumpfuß	EN	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		
<i>Cortinarius raphanoides</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Rettich-Rauhkopf	EN	D1		seltener Birken-Begleiter
<i>Cortinarius rheubarbarinus</i> R. Hry	Rhabarber-Wasserkopf	NT			
<i>Cortinarius rufoolivaceus</i> (Pers.: Fr.) Fr.	Violetter Klumpfuß	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius saniosus</i> (Fr.) Fr.	Gelbgeschmückter Gürtelfuß	EN	B1ab(iv)		
<i>Cortinarius saporatus</i> Britzelm.	Ockergelber Klumpfuß	EN	D1		
<i>Cortinarius schaefferi</i> Bres.	Hainbuchen-Hautkopf	NT			
<i>Cortinarius scutulatus</i> Fr.	Violetter Rettich-Gürtelfuß	VU	B1ab(iii,iv)		Moore
<i>Cortinarius sebaceus</i> Fr.	Rasiger Schleimkopf	VU	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		kein subalpiner Fichtenwaldpilz
<i>Cortinarius sodagnitus</i> R. Hry	Violetter Klumpfuß	VU	B1ab(iii)		
<i>Cortinarius solis-occasus</i> Melot	Abendrot-Gürtelfuss	NT			
<i>Cortinarius spadiceus</i> (Batsch) Fr.	Brauner Schleimkopf	EN	D1		
<i>Cortinarius subannulatus</i> Jul. Schaeff. et M.M. Moser apud M.M. Moser	Fastberingter Rauhkopf	EN	D1		wohl schwierige Identifikation
<i>Cortinarius subferrugineus</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Rostbräunlicher Wasserkopf	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius subporphyropus</i> Pilat	Graublauer Zwerg-Schleimkopf	EN	B2ab(iii)		
<i>Cortinarius subpurpurascens</i> (Batsch) Kickx	Falscher Purpur-Klumpfuss	CR	A2ac		Letzte Fundmeldung 1940
<i>Cortinarius suillus</i> Fr. ss. J.E. Lange	Schweins-Dickfuss	NT			Laubwaldart auf Kalk
<i>Cortinarius talus</i> Fr.	Falbblättriger Klumpfuß	EN	D1		Wald-Sonderstandorte
<i>Cortinarius tophaceus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Goldfuchsigiger Rauhkopf	EN	D1		
<i>Cortinarius triumphans</i> (Fr.) Fr.	Birken-Schleimkopf	VU	B1ab(iii)		Moore, moorige Wälder, Heiden
<i>Cortinarius trivialis</i> J.E. Lange	Natterstielliger Schleimfuß	NT			
<i>Cortinarius tubarius</i> Ammirati et A.H. Sm.	Torfmoos-Hautkopf	NT			
<i>Cortinarius turmalis</i> Fr.	Rasiger Seidenkopf	EN	D1		
<i>Cortinarius uliginosus</i> Berk.	Kupferroter Hautkopf	NT			
<i>Cortinarius variegatus</i> Bres.	Variabler Seidenkopf	EN	D1		
<i>Cortinarius vespertinus</i> (Fr.) Fr.	Blasser Schleimkopf	EN	D1		
<i>Cortinarius vulpinus</i> (Velen.) R. Hry	Fuchsigbrauner Schleimkopf	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius xanthophyllus</i> (Cooke) R. Hry	Goldblättriger Klumpfuß	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Cortinarius zinziberatus</i> (Scop.: Fr.) Fr.	Olivgelber Rauhkopf	EN	D1		
<i>Cotylidia undulata</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	Pfifferlings-Warzenpilz	EN	D1		
<i>Creolophus cirrhatus</i> (Pers.: Fr.) Karst.	Dorniger Stachelbart	VU	B1ab(iii,iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Crepidotus autochthonus</i> J.E. Lange	Gebrechlicher Krüppelfuß	EN	D1		
<i>Crepidotus ehrendorferi</i> Hauskn. et Krisai	Bleiches Stummelfüsschen	CR	D1		
<i>Crepidotus versutus</i> (Peck) Sacc.	Weichhaariger Krüppelfuß	NT			
<i>Crinipellis scabella</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Murrill	Wiesen-Haarschwindling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Cristinia gallica</i> (Pilát) Juelich	Gallischer Rindenpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Cristinia helvetica</i> (Pers.) Parmasto	Schweizer-Rindenpilz	NT			
<i>Crocicreas calathicola</i> (Rehm) Carp.	Distel-Stengelbecherchen	NT			alpine Art bei <i>Cirsium spinosissimum</i>
<i>Cudoniella clavus</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Dennis	Wasserkreisling	VU	B1ab(iv)		
<i>Cyphella digitalis</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	Tannen-Fingerhut	VU	B1ab(iv)		
<i>Cyphelostereum laeve</i> (Fr.: Fr.) D.A. Reid	Glatter Becher-Schichtpilz	EN	D1		nährstoffarme Böschungen, zwischen Moosen
<i>Cystoderma superbum</i> Huijsman	Weinroter Körnchenschirmling	VU	B1ab(iv)		
<i>Cystoderma terrei</i> (Berk. et Broome) Harmaja	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	VU	B1ab(iv)		
<i>Cystolepiota moelleri</i> Knudsen	Rötlicher Mehlschirmling	EN	B1ab(iv)		
<i>Dacrymyces minor</i> Peck	Kleinste Gallerträne	NT			
<i>Dacryobolus sudans</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	Tränender Stachelrindenpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Daldinia occidentalis</i> Child	Oestlicher Holzkohlenpilz	EN	D1		nur aus den Südalpen bekannt
<i>Dendrothele acerina</i> (Pers.: Fr.) P.A. Lemke	Ahorn-Baumwarzenpilz	NT			Alte Ahorne
<i>Dentipellis fragilis</i> (Pers.: Fr.) Donk	Zahnhaut	EN	B1ab(iv)		
<i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.: Fr.) Bon	Keilblättriger Samtritterling	VU	B1ab(iii)		
<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i> Herink ex Bon	Gefeldeter Samtritterling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Dichomitus campestris</i> (Quel.) Dom. et Orl.	Schwärzende Tramete	VU	B1ab(iv)		
<i>Diplomitoporus flavescens</i> (Bres.) Domanski	Gilbende Nadelholz-Tramete	EN	B1ab(iv)		
<i>Discina leucoxantha</i> Bres.	Dottergelbe Scheibenlorchel	EN	D1		
<i>Discina melaleuca</i> Bres.	Schwarzweiße Scheibenlorchel	EN	D1		
<i>Discina parma</i> Breitenbach et Maas-Geest.	Schildförmige Scheibenlorchel	EN	D1		
<i>Disciseda bovista</i> (Klotzsch) P.Henn.	Großer Scheibenbovist	CR	A1ac		Letzte Fundmeldung 1950
<i>Disciseda candida</i> (Schwein.) Lloyd	Kleiner Scheibenbovist	EN	B2ab(iii,iv)+D1		Walliser Steppenrasen, offene sandige Stellen
<i>Encoelia fascicularis</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Karst.	Schwarzbrauner Büschelbecherling	EN	D1		
<i>Entoloma alpicola</i> (J. Favre) Noordel.	Alpiner Rötling	VU	D1		alpine Art, eher selten
<i>Entoloma aprile</i> (Britzelm.) Sacc.	April-Rötling	VU	B1ab(iii,iv)		Frühlingspilz, mit dem Ulmensterben abnehmend
<i>Entoloma asprellum</i> (Fr.: Fr.) Fayod	Körniger Rötling	VU	B1ab(iii,iv)		auch alpin
<i>Entoloma atrocoeruleum</i> Noordel.	Schwarzblauer Rötling	VU	D1		auch alpin
<i>Entoloma atrosericeum</i> (Kuehner) Noordel.	Schwarzseidiger Rötling	VU	D1		alpine Art
<i>Entoloma bloxamii</i> (Berk. et Broome) Sacc.	Blauer Rötling	EN	B2ab(ii,iii)		in mageren Wiesen und Weiden
<i>Entoloma caccabus</i> (Kuehner) Noordel.	Genabelter Rötling	EN	D1		
<i>Entoloma carneogriseum</i> (Berk. et Broome) Noordel.	Lilagrauer Rötling	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Entoloma clandestinum</i> (Fr.) Noordeloos	Dickblättriger Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Entoloma corvinum</i> (Kuehner) Noordel.	Schwarzblauer Rötling	VU	B1ab(iii)		
<i>Entoloma costatum</i> (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Geripptblättriger Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
Entoloma cuspidiferum (Kuehner et Romagn.) Noordel.	Spitzhütiger Rötling	EN	B1ab(iii,iv)		Letzte Fundmeldung 1999
Entoloma dichroum (Pers.: Fr.) P. Kumm.	Blaustieliger Holzrötling	VU	D1		
Entoloma dysthaloides Noordel.	Behaarter Rötling	VU	D1		
Entoloma elodes (Fr.: Fr.) P. Kumm.	Heide-Rötling	VU	D1		zerstreut
Entoloma exile (Fr.) Hesler	Schmächtiger Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		
Entoloma favrei Noordel.	Favre's Rötling	EN	D1		zerstreut, wenig neuere Funde
Entoloma griseocyanum (Fr.) M.M. Moser	Graublauer Rötling	VU	B1ab(iii)		auch alpin
Entoloma griseoluridum (Kuehner) M.M. Moser	Graubrauner Rötling	VU	D1		
Entoloma griseorubidum (Kuehner) Noordel.	Graueroter Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		
Entoloma infula (Fr.) Noordel.	Bischofsmützen-Glöckling	VU	D1		zerstreut
Entoloma jubatum (Fr.) Karst.	Rußblättriger Rötling	VU	D1		
Entoloma lanicum (Romagn.) Moser, Noordel.	Wolliger Nabelrötling	VU	D1		
Entoloma lepidissimum (Svrcek) Noordel.	Blauschuppiger Rötling	VU	D1		
Entoloma lividocyanulum Kuehner ex Noordel.	Graublaustieliger Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		
Entoloma majaloides P.D. Orton	Gelbbrauner Rötling	VU	D1		
Entoloma minutum (P. Karst.) Noordel.	Bräunlicher Erlen-Rötling	EN	D1		zerstreut in Auenwäldern und Magerrasen
Entoloma neglectum (Lasch: Fr.) Moser	Isabellfarbener Nabelrötling	EN	D1		
Entoloma phaeocyathus Noordel.	Becher-Nabeling	EN	D1		
Entoloma placidum (Fr.:Fr.) Noordel.	Buchenwald-Rötling	VU	D1		
Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel.	Filzig-faseriger Rötling	EN	B1ab(iv)		
Entoloma porphyrophaeum (Fr.) P. Karst.	Porphyrbrauner Rötling	EN	B2ab(iii)		
Entoloma prunuloides (Fr.: Fr.) Quel.	Mehl-Rötling	VU	B1ab(iii,iv)		
Entoloma pseudocoelestinum Arnolds	Faserschuppiger Rötling	VU	D1		
Entoloma pseudoturbidum (Romagn.) M.M. Moser	Sepiabrauner Rötling	VU	B1ab(iv)		im ganzen Mittelland vertreten, in den letzten 5 Jahren stark abnehmend
Entoloma rhodocylix (Lasch: Fr.) M.M. Moser	Becher-Rötling	VU	D1		
Entoloma roseum (Longyear) Hesler	Rosafarbiger Rötling	CR	D1		
Entoloma saepium (Noulet et Dassier) Richon et Roze	Blaßbrauner Schlehen-Rötling	VU	B1ab(iii,iv)		Frühlingspilz, Gebüsch
Entoloma saundersii (Fr.) Sacc.	Silbergrauer Rötling	VU	D1		Frühjahrspilz
Entoloma scabiosum (Fr.) Quel.	Gründiger Rötling	VU	D1		
Entoloma sericatum (Britzelm.) Sacc.	Seidenhütiger Rötling	VU	D1		
Entoloma sordidulum (Kuehner et Romagn.) P.D. Orton	Horngrauer Mehl-Rötling	VU	D1		
Entoloma sphagnum (Romagn. et J. Favre) Noordel.	Sumpf-Rötling	EN	D1		
Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel. 1979	Rothaariger Rötling	NT			
Entoloma tjallingiorum Noordel.	Tjallingis Rötling	VU	D1		
Entoloma turci (Bres.) M.M. Moser	Breitstieliger Rötling	EN	B1ab(ii,iii)		
Entoloma versatile (Fr.) M.M. Moser	Olivbrauner Rötling	VU	D1		
Entoloma vinaceum (Scop.) Arnolds et Noordel.	Weinroter Rötling	EN	D1		
Entoloma xanthochroum (P.D. Orton) Noordel.	Gelblicher Rötling	VU	D1		auch subalpin
Eriopezia caesia (Pers.:Fr.) Rehm	Schwarzes Spinnwebbecherchen	NT			

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Erythricium laetum</i> (P. Karst.) J. Erikss. et Hjortstam	Leuchtender Rosarindenpilz	VU	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D1		
<i>Exidia cartilaginea</i> S. Lundell et Neuhoff	Knorpeliger Drüsling	CR	A2a		Letzte Fundmeldung 1984
<i>Exobasidium karstenii</i> Sacc. et Trotter	Rosmarinheide-Nacktbasidie	EN	B1ab(iii,iv)		bereits Substratpflanze VU!
<i>Exobasidium pachysporum</i> Nannf.	Dicksporige Rauschbeernacktbasidie	EN	B1ab(iii,iv)		Letzte Fundmeldung 1998
<i>Exobasidium rostrupii</i> Nannf.	Rotfleckiger Moosbeernacktbasidie	NT			
<i>Exobasidium vacciniuliginosi</i> Boud.	Rauschbeer-Nacktbasidie	VU	D1		
<i>Faerberia carbonaria</i> (Alb. et Schwein.) Pouzar	Kohlenleistling	NT			Brandstellenpilz
<i>Fibrodontia gossypina</i> Parmasto		NT			letzte Fundmeldung 1993
<i>Fibroporia vaillantii</i> (DC.: Fr.) Parmasto		EN	A3a		Letzte Fundmeldung 1991
<i>Flammulaster carpophilus</i> (Fr.) Earle	Fleischfarbiger Flockenschüppling	VU	B1ab(iv)		
<i>Flammulaster ferrugineus</i> (Maire ex Kuehner) Watling	Rostbrauner Flockenschüppling	EN	D1		
<i>Flammulaster granulatus</i> (J.E. Lange) Watling	Körniger Flockenschüppling	EN	B2ab(iv)		
<i>Flammulaster limulatus</i> (Weinm.:Fr.) Watling	Orangebrauner Flockenschüppling	VU	D2		
<i>Flammulaster muricatus</i> (Fr.) Watling	Grobwarziger Flockenschüppling	VU	D2		
<i>Flammulina fennae</i> Bas	Fennas Samtfüßrübling	VU	D1		sandiger Boden, Auenwald, an Weiden und Birken
<i>Floccularia straminea</i> (P. Kumm.) Pouzar	Schwefelgelber Schuppenritterling	CR	A1ac		Graslandart, letzte Fundmeldung 1975
<i>Fomitopsis rosea</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst.	Rosenroter Baumschwamm	NT			
<i>Galerina cinctula</i> P.D. Orton	Gürtel-Helmling	EN	D1		
<i>Galerina jaapii</i> A.H. Sm. et Singer	Beringter Häubling	EN	D1		
<i>Galerina pseudomniophila</i> Kuehner	Schokoladenbrauner Häubling	EN	D1		
<i>Galerina pseudotundrae</i> Kuehner	Kompakter Häubling	VU	D1		alpine Art
<i>Galerina salicicola</i> P.D. Orton	Weiden-Häubling	EN	D1		
<i>Galerina sphagnum</i> (Pers.:Fr.) Kuehner	Sumpf-Häubling	NT			in Hochmooren
<i>Galerina tibicystis</i> (G.F. Atk.) Kuehner	Bereifter Häubling	NT			in Hochmooren
<i>Galzinia incrustans</i> (Hoehn. et Litsch.) Parmasto	Krustiger Galzin-Pilz	VU	D1		
<i>Ganoderma resinaceum</i> Boud.	Harziger Lackporling	VU	B1ab(iv)		
<i>Ganoderma valesiacum</i> Boud.	Walliser Lackporling	EN	D1		
<i>Gastrosporium simplex</i> Matt.	Steppentrüffel	CR	B1ab(ii,iii)+D1		Xerotherme Standorte
<i>Gautieria mexicana</i> (Fischer) Zeller et Dodge	Kleinkammerige Morchelrüffel	CR	A1ac		Letzte Fundmeldung 1975
<i>Geastrum coronatum</i> Pers.: Pers.	Dunkler Erdstern	CR	A4a		Letzte Fundmeldung 1956
<i>Geastrum melanocephalum</i> (Czern.) V.J. Stanek	Riesen-Erdstern, Haarstern	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Geastrum nanum</i> Pers.	Zwerg-Erdstern	EN	D1		
<i>Geastrum striatum</i> DC.: Pers.	Kragen-Erdstern	NT			wärmere Lagen
<i>Geoglossum cookeianum</i> Nannfeld	Trockene Erdzunge	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Geoglossum glutinosum</i> Pers.: Fr.	Klebrigschwarze Erdzunge	VU	D1		Feuchtwiesen
<i>Geopyxis foetida</i> Velen.	Stinkender Kohlenbecherling	VU	D1		
<i>Gerronema brevbasiadiatum</i> (Singer) Singer	Papillen-Nabeltrichterchen	CR	A2ac		Letzte Fundmeldung 1950
<i>Gerronema chrysophyllum</i> (Fr.) Singer	Goldblättriger Holz-Nabeling	EN	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Gerronema josserandii</i> Singer	Exzentrischer Trichterling	EN	B1ab(ii,iii)		magere, saure Böden, Grasland, nur aus dem Tessin bekannt
<i>Gerronema marchantiae</i> Singer et Clemençon	Lebermoos-Nabeltrichterchen	VU	D2		
<i>Gerronema prescottii</i> (Weinm.) Redhead	Bräundendes Nabeltrichterchen	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Gerronema strombodes</i> (Berk. et Mont.) Singer	Gelblättriger Holz-Nabeling	VU	D2		
<i>Gloeocystidiellum lactescens</i> (Berk.) Boidin	Milchender Saftzistidling	VU	D1		seltene Art
<i>Gloeocystidiellum ochraceum</i> (Fr.:Fr.) Donk	ockerfarbener Saftzistidling	VU	D1		seltene Art
<i>Gloeoporus dichrous</i> (Fr.: Fr.) Bres.	Zweifarbiger Knorpelporling	VU	B1ab(iv)		
<i>Gomphidius gracilis</i> Berk. et Broome	Rotbrauner Schmierling	NT			Bei Lärchen
<i>Gomphidius roseus</i> (L.) Fr.	Rosenroter Schmierling	VU	B1ab(iii)		
<i>Guepiniopsis buccina</i> (Pers.: Fr.) L.L. Kenn.	Becherförmiger Haargellertpilz	VU	D1		Genferbecken und Südschweiz
<i>Gymnopilus flavus</i> (Bres.) Singer	Blaßgelber Fälbling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Gymnopilus odini</i> (Fr.) Kuehner et Romagn.	Kohlen-Fälbling	EN	D1		Auch auf Brandstellen
<i>Gymnopilus picreus</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	Rotbrauner Flämmling	EN	D1		
<i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.) Kuehner et Romagn.	Weißbeschleierter Flämmling	EN	D1		
<i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> (Joss.) Kuehner et Romagn.	Kugelsporiger Flämmling	VU	D2		Morsches Nadelholz
<i>Gyromitra accumbens</i> (Rahm) Harmaja	Anliegende Scheibenlorchel	VU	D1		
<i>Gyroporus castaneus</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Hasenröhrling, Zimtröhrling	VU	B1ab(iii)		
<i>Haasiella venustissima</i> (Fr.) Kottl. et Pouzar	Orangeroter Goldnabeling	EN	D1		
<i>Hebeloma claviceps</i> (Fr.) P. Kumm. ss. Ricken	Krempenrandiger Fälbling	EN	B2ab(iv)		Taxonomie wohl etwas unklar
<i>Hebeloma fastibile</i> (Pers.: Fr.) P. Kumm. ss. J.E. Lange	Büscheliger Fälbling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hebeloma helodes</i> J. Favre	Sumpffälbling	VU	D1		
<i>Hebeloma minus</i> Bruchet	Freudiger Fälbling	VU	D1		alpine Art
<i>Hebeloma perpallidum</i> M.M. Moser		VU	D1		
<i>Hebeloma pumilum</i> J.E. Lange	Zwerg-Fälbling	VU	D1		
<i>Hebeloma remyi</i> Bruchet	Unbekannter Fälbling	VU	D1		subalpine Art, wenig bekannt
<i>Hebeloma sinuosum</i> (Fr.) Quel.	Stolzer Fälbling	VU	D1		
<i>Hebeloma strophosum</i> (Fr.) Sacc.	Flämmlings-Fälbling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hebeloma syrjense</i> P. Karst.	Seifen-Fälbling	VU	D1		
<i>Hebeloma tomentosum</i> (M.M. Moser) Groeger et Zschieschang	Feinfilziger Fälbling	VU	D1		
<i>Hebeloma versipelle</i> (Fr.) Gillet ssVU. Romagn.	Flämmlings-Fälbling	VU	D1		
<i>Helvella dissingii</i> Korf	Dissing's Lorchel	VU	B1ab(iv)		
<i>Helvella phlebophora</i> Pat. et Doass.	Rillstielige Lorchel	EN	B1ab(iv)		unter Laubbäumen
<i>Helvella queletii</i> Bres.	Rippenstielige Becherlorchel	VU	B1ab(ii,iv)		
<i>Hemimycena crispata</i> (Kuehner) Singer	Breitsporiger Scheinhelmling	VU	D1		
<i>Hemimycena mairei</i> (E.J. Gilbert) Singer	Rasen-Scheinhelmling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Hemimycena ochrogaleata</i> (J. Favre) M.M. Moser	Ockerhütiger Scheinhelmling	VU	D1		An <i>Cirsium spinosissimum</i>
<i>Hericium coralloides</i> (Scop.: Fr.) Gray em. Fr., Hallen.	Ästiger Stachelbart	VU	B1ab(iii,iv)		An grobem Laubholz
<i>Hericium erinaceum</i> (Bull.: Fr.) Pers.	Igel-Stachelbart	EN	B1ab(ii,iv)+D1		
<i>Hericium flagellum</i> (Scop.) Pers.	Tannen-Stachelbart, Alpen-Stachelbart	VU	B1ab(iv)		An grobem Tannenholz

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i> (Maire) Singer	Ohrlöffel-Muscheling	VU	D1		Bis vor kurzem schlecht dokumentierte Art
<i>Hohenbuehelia grisea</i> (Peck) Singer	Grauer Muscheling	VU	D2		
<i>Hohenbuehelia longipes</i> (Boud.) M.M. Moser	Moor-Muscheling	CR	D1		Moore, Sümpfe
<i>Hohenbuehelia mastrucata</i> (Fr.: Fr.) Singer	Gelatinöser Muscheling	EN	B1ab(iv)+D1		fehlt in der Westschweiz
<i>Hohenbuehelia petaloides</i> (Bull.: Fr.) Schulzer	Spatelförmiger Muscheling	NT			
<i>Hyaloscypha leuconica</i> (Cke) Nannf.	Weißhaariges Nadelholzbecherchen	NT			
<i>Hydnellum auratile</i> (Britzelm.) Maas-Geest.	Orangebrauner Korkstacheling	EN	B1ab(iii,iv)+ B2ab(ii)		
<i>Hydnellum compactum</i> (Pers.: Fr.) P. Karst.	Derber Korkstacheling	EN	B1ab(iii,iv)		Letzte Fundmeldung 1987
<i>Hydnellum geogenium</i> (Fr.) Banker	Gelber Korkstacheling	EN	D1		in Süddeutschland verschollen seit 1969
<i>Hydnellum spongiosipes</i> (Peck) Pouzar	Samtiger Korkstacheling	VU	D1		
<i>Hydnocystis piligera</i> Tul.	Behaartes Hohltrüffelchen	VU	D1		
<i>Hydnum albidum</i> Peck	Weißer Stoppelpilz	EN	B1ab(iii,iv)+ B2ab(iii)		
<i>Hydopus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	Schwärzender Wasserfuß	EN	D1		an morschem Nadelholz
<i>Hydopus scabripes</i> (Murrill) Singer	Knorpelstieler Wasserfuss	VU	D1		
<i>Hygrocybe calciphila</i> Arnolds	Schmutziger Filz-Saftling	VU	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe calyptriformis</i> (Berk. et Broome) Fayod	Rosenroter Saftling	CR	C1+C2a(i)	§ ^{CH}	Grasland
<i>Hygrocybe ceracea</i> (Wulfen: Fr.) P. Kumm.	Zerbrechlicher Saftling	VU	B1ab(iii)		Grasland
<i>Hygrocybe citrinovirens</i> (J.E. Lange) Jul. Schaeff.	Kleinhütiger Saftling	NT			Grasland, moosig, feucht
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i> (P.D. Orton) M.M. Moser	Torfmoos-Saftling	EN	C1+C2a(i)		sumpfige Standorte mit Sphagnum und Molinia
<i>Hygrocybe conicopalustris</i> R. Haller	Kegeliger Sumpf-Saftling	NT			Grasland, sumpfig
<i>Hygrocybe fornicata</i> (Fr.) Singer	Blaßrandiger Saftling	VU	B1ab(iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe helobia</i> (Arnolds) Bon	Gelblättriger Filz-Saftling	VU	B1ab(iii)		sumpfige Standorte, Moore
<i>Hygrocybe ingrata</i> J.L. Jensen et F.H. Moeller	Rötender Nitrat-Saftling	EN	B1ab(iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe insipida</i> (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser	Gelbrandiger Saftling	EN	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe intermedia</i> (Pass.) Fayod	Trockener Saftling	NT			Grasland
<i>Hygrocybe konradii</i> R. Haller	Chromgelber Saftling	VU	B1ab(ii,iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe laeta</i> (Pers.: Fr.) P. Kumm.	Zäher Saftling	VU	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.) P. Kumm.	Mennigroter Filz-Saftling	NT			Grasland
<i>Hygrocybe mucronella</i> (Fr.) P. Karst.	Bitterer Saftling	EN	B1ab(iv)		Grasland
<i>Hygrocybe nitrata</i> (Pers.: Fr.) Wuensche	Nichtrötender Nitrat-Saftling	VU	B1ab(iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe obrussea</i> (Fr.: Fr.) Wuensche	Gebuckelter Saftling	VU	B1ab(ii,iii,iv)+C1		Grasland
<i>Hygrocybe ovina</i> (Bull.: Fr.) Kuehner	Olivschwarzer Saftling	VU	B1ab(iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe parvula</i> (Peck) Murrill	Schmächtiger Saftling	EN	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe persistens</i> (Britzelm.) Singer	Spitzgebuckelter Saftling	NT			Grasland
<i>Hygrocybe punicea</i> (Fr.) P. Kumm.	Granatroter Saftling	VU	B1ab(ii,iii,iv)		Grasland
<i>Hygrocybe reidii</i> Kuehner	Honig-Saftling	VU	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe spadicea</i> (Scop.: Fr.) P. Karst.	Schwarzgelber Schleim-Saftling	EN	D2		Grasland
<i>Hygrocybe subglobispora</i> (P.D. Orton) M.M. Moser	Blaßblättriger Sommer-Saftling	EN	B1ab(ii,iii)		Grasland
<i>Hygrocybe turunda</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Ringflockiger Saftling	VU	B1ab(iii)		Grasland

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Hygrophorus arbustivus</i> (Fr.) Fr.	Mehlstiel-Schneckling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hygrophorus atramentosus</i> (Secr.) Haas et R. Haller	Schwarzfaseriger Schneckling	VU	D1		
<i>Hygrophorus calophyllus</i> P. Karst.	Schönblättriger Schneckling	EN	B1ab(iv)		
<i>Hygrophorus hedrychii</i> Val.	Birken-Schneckling	VU	B1ab(iii)		
<i>Hygrophorus latitabundus</i> Britzelm.	Großer Kiefern-Schneckling	VU	B1ab(iii)		unter Föhren in Trockenrasen
<i>Hygrophorus leporinus</i> Fr.	Hasen-Schneckling	CR	B1ab(iii)+D1		
<i>Hygrophorus leucophaeus</i> (Scop.:Fr.) Fr.	Seidiggerandeter Schneckling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hygrophorus ligatus</i> Fr.	Schleimigbringter Schneckling	VU	B1ab(iii)		unter Föhren in Trockenrasen
<i>Hygrophorus lindtneri</i> M.M. Moser	Hellrandiger Schneckling	VU	B1ab(iii)		
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	März-Schneckling	NT			
<i>Hygrophorus mesotephrus</i> Berk. et Broome	Olivgrauer Schneckling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hygrophorus persicolor</i> Ricek	Flamingo-Schneckling	VU	D1		Funde aus der Westschweiz fehlen
<i>Hygrophorus pleurotoides</i> J. Favre	Seitenstieliger Schneckling	CR	D1		Pilz der subalpinen Stufe
<i>Hygrophorus poetarum</i> Heim	Isabellrötlicher Schneckling	VU	B1ab(iii)+2ab(iii)		
<i>Hygrophorus purpurascens</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	Beschleierter Schneckling	EN	B1ab(iv)		
<i>Hygrophorus russula</i> (Schaeff.: Fr.) Quel.	Geflecktblättriger Purpurschneckling	VU	B1ab(iii)		
<i>Hygrophorus spodoleucus</i> M.M. Moser	Fälblings-Schneckling	CR	D1		
<i>Hymenochaete cruenta</i> (Pers.: Fr.) Donk	Blutrote Borstenscheibe	VU	B1ab(iii,iv)		An Tannenästern, Aerophyt
<i>Hymenochaete tabacina</i> (Sowerby: Fr.) Lev.	Tabakbraune Borstenscheibe	VU	B1ab(iv)		
<i>Hymenogaster vulgaris</i> Tul.ap.Berk. et Broome	Rissige Erdnuß	CR	A4a		Letzte Fundmeldung 1976
<i>Hymenoscyphus albidus</i> (Rob. ex Desm.) Phill.	Weißes Stengelbecherchen	VU	D1		an Petiolen
<i>Hymenoscyphus equisetinus</i> (Velen.) Dennis	Schachtelhalm-Stengelbecher	VU	D1		Fühlingsart
<i>Hymenoscyphus imberbis</i> (Bull.: Fr.) Dennis	Bartloses Stielbecherchen	VU	D1		
<i>Hymenoscyphus immutabilis</i> (Fuckel) Dennis	Wohlgestaltiger Stengelbecherling	NT			
<i>Hymenoscyphus rhodoleucus</i> (Fr.:Fr.) Phill.	Rosaweißer Stengelbecherling	VU	D1		
<i>Hyphoderma capitatum</i> J. Erikss. et A. Strid	Kopfzystiden-Rindenpilz	VU	D1		
<i>Hyphoderma roseocreum</i> (Bres.) Donk	Rosafleckiger Rindenpilz	VU	D2		
<i>Hyphoderma transiens</i> (Bres.) Parmasto	Veränderlicher Rindenpilz	EN	B1ab(iv)		nur aus den Südalpen
<i>Hyphodermella corrugata</i> (Fr.) J. Erikss. et Ryvarde	Runzelig-höckeriger Rindenpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Hyphodontia abieticola</i> (Bourdot et Galzin) J. Erikss.	Zähnenrindenpilz	VU	D1		
<i>Hyphodontia cineracea</i> (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Hjortstam	Aschgrauer Zähnenrindenpilz	NT			
<i>Hyphodontia quercina</i> (Pers.: Fr.) J. Erikss.	Eichen-Stachelhaut	VU	D1		
<i>Hyphodontia rimosissima</i> (Peck) Gilberts	Feinwarziger Zähnenrindenpilz	NT			Übersehen?
<i>Hyphodontia spathulata</i> (Schrad.: Fr.) Parmasto	Abgeplattetstacheliger Zähnenrindenpilz	VU	D1		
<i>Hyphodontia subalutacea</i> (P. Karst.) J. Erikss.	Alutaceaähnlicher Zähnenrindenpilz	NT			
<i>Hypholoma ericaeoides</i> P.D. Orton	Geriefter Schwefelkopf	EN	B1ab(iii)		
<i>Hypholoma laeticolor</i> (F.H. Moeller) P.D. Orton	Freudiger Schwefelkopf	EN	B1ab(iii)		
<i>Hypholoma polytrichii</i> (Fr.: Fr.) Ricken	Moos-Schwefelkopf	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Hypholoma subericaeum</i> (Fr.) Kuehner	Teichrand-Schwefelkopf	EN	B1ab(ii,iii)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Hypochnicium bombycinum</i> (Sommerf.: Fr.) J. Erikss.	Seidiger Membranrindenpilz	NT			
<i>Hypochnicium detriticum</i> (Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden	Pflanzenrestenbewohnender Membranrindenpilz	VU	D1		
<i>Hypochnicium vellereum</i> (Ellis et Cragin) Parmasto	Chlamydospor-Membranrindenpilz	NT			vor allem im Tessin
<i>Hypocreopsis lichenoides</i> (Tode: Fr.) Seaver	Weiden-Scheinflechtenpilz	EN	D1		Moorweidengebüsch
<i>Hypoxylon howeanum</i> Peck	Zimtbraune Kohlenbeere	EN	D2		
<i>Hypoxylon serpens</i> (Pers.:Fr.) Fr.	Gewundene Kohlenbeere	EN	B1ab(iv)+D1		
<i>Hypsizygus ulmarius</i> (Bull.: Fr.) Redhead	Ulmen-Rasling	EN	B1ab(iii)		Ulmensterben reduziert die kleine Population, urban!
<i>Hysterangium separabile</i> Zeller	Gelbe Schwanztrüffel	CR	D1		
<i>Inocybe agardhii</i> (N. Lund.) P.D. Orton	Feinschuppiger Rißpilz	EN	D1		sandige Orte, Spezialstandorte
<i>Inocybe albovelutipes</i> Stangl	Hellsamtiger Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe alnea</i> Stangl	Erlen-Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe amblyspora</i> Kuehner	Stumpfsporiger Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe auricoma</i> (Batsch) J.E. Lange	Kittfarbener Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe bresadolae</i> Masee	Rötlichfuchsigiger Risspilz	VU	Bab(iii,iv)		Auenwald, eher wärmere Lagen
<i>Inocybe calospora</i> Quel.	Schönsporiger Rißpilz	VU	D1		
<i>Inocybe concinnula</i> J. Favre	Zwergweiden-Risspilz	VU	D2		alpine Stufe
<i>Inocybe curvipes</i> P. Karst.	Dickfüßiger Rißpilz	VU	B1ab(iii,iv)		feuchte Standorte
<i>Inocybe decipiens</i> Bres.	Graubrauner Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe dunensis</i> P.D. Orton	Dünen-Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe flavella</i> P. Karst.	Weiss-scheiteliger Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe frigidula</i> J. Favre	Kältevertragender Risspilz	VU	D2		alpine Stufe
<i>Inocybe geraniadora</i> J. Favre	Geranien-Risspilz	EN	D1		primär alpine Art
<i>Inocybe griseovelata</i> Kuehner	Graubeschleierter Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe gymnocarpa</i> Kuehner	Rotschuppiger Rißpilz	NT			
<i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl et Veselsky	Falscher Bittermandel-Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe humilis</i> J. Favre	Kleinwüchsiger Risspilz	CR	A4a		Letzte Fundmeldung 1950
<i>Inocybe hygrophorus</i> Kuehner	Schnecklings-Risspilz	CR	D1		
<i>Inocybe hystrix</i> (Fr.) P. Karst.	Sparriger Rißpilz	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Inocybe inodora</i> Velen.	Geruchloser Risspilz	NT			
<i>Inocybe leptocystis</i> G.F. Atk.	Dunnwandzystiden-Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe luteipes</i> J. Favre	Leuchtstiel-Risspilz	VU	D2		alpine Art, selten
<i>Inocybe maculipes</i> J. Favre	Silberwurz-Risspilz	VU	D1		sehr wenig rezente Funde
<i>Inocybe margaritospora</i> (Berk. ap.Cooke) Sacc.	Graubeigeblättriger Risspilz	VU	B1ab(iii)		
<i>Inocybe melanopus</i> D.E. Stuntz	Braungestiefelter Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe monochroa</i> J. Favre	Einfarbiger Risspilz	VU	D2		
<i>Inocybe mundula</i> (J. Favre) Senn-Irlet	Zierlicher Risspilz	VU	D2		
<i>Inocybe oblectabilis</i> (Britzelm.) Sacc.	Ansehnlicher Risspilz	VU	B1ab(iii)		
<i>Inocybe ovatocystis</i> Boursier et Kuehner	Rundzystiden-Risspilz	VU	B1ab(iii,iv)		warum nicht im Mittelland?
<i>Inocybe paludinella</i> (Peck) Sacc.	Gelblichweißer Rißpilz	NT			
<i>Inocybe perlata</i> (Cooke) Sacc.	Breithütiger Risspilz	VU	D2		
<i>Inocybe phaeosticta</i> Furrer	Gescheckter Risspilz	VU	D2		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Inocybe proximella</i> P. Karst.	Haselbrauner Risspilz	EN	D1		Moore
<i>Inocybe pseudohiulca</i> Kuehner	Falscher Höckerspor-Risspilz	VU	D1		
<i>Inocybe relicina</i> Fr.	Gelblättriger Risspilz	CR	A4a		Letzte Fundmeldung 1940
<i>Inocybe rhacodes</i> J. Favre	Fransiger Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe salicis</i> Kuehner	Weiden-Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe sambucina</i> (Fr.) Quel.	Fliederweißer Rißpilz	EN	D1		sandige Standorte
<i>Inocybe squamata</i> J.E. Lange	Dunkelschuppiger Rißpilz	VU	D1		
<i>Inocybe strigiceps</i> Horak 1979	Pygmäen-Risspilz	VU	D2		
<i>Inocybe tabacina</i> Furrer-Ziogas	Auwald-Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe tenebrosa</i> Quel.	Schwarzfüßiger Rißpilz	EN	D1		
<i>Inocybe tricolor</i> Kuehner	Dreifarbiger Risspilz	EN	D1		
<i>Inocybe umbratica</i> Quel.	Weißlicher Rißpilz	NT			
<i>Inocybe vulpinella</i> Bruyl.	Fuchsigbrauner Rißpilz	NT			sandige Alluvionen
<i>Inocybe xanthomelas</i> Kuehner et Boursier	Dunkelstieliger Risspilz	EN	D1		
<i>Inonotus cuticularis</i> (Bull.: Fr.) P. Karst.	Flacher Schillerporling	EN	B1ab(iv)		
<i>Inonotus dryadeus</i> (Pers.: Fr.) Murrill	Tropfender Schillerporling	NT			
<i>Inonotus obliquus</i> (Pers.:Fr.) Pilat	Schiefer Schillerporling	VU	B1ab(iv)		Rückgang real?
<i>Inonotus rheades</i> (Pers.) P. Karst.	Fuchsroter Schillerporling	EN	B1ab(iv)		
<i>Inomidotis fulvotagens</i> (Berk. et M.A. Curtis) Cash	Braunschwarzer Rindenbecher	NT			
<i>Ischnoderma resinosum</i> (Fr.) P. Karst.	Laubholz-Harzpöring	EN	B1ab(iv)		
<i>Ischnoderma trogii</i> (Fr.) Donk	Gestielter Harzpöring	VU	B1ab(iv)		
<i>Jahnoporus hirtus</i> (Cooke) Nuss	Rauher Schafpöring	EN	D1		
<i>Laccaria tortilis</i> (Bolton) Cooke	Stachelsporiger Lacktrichterling	NT			
<i>Lachnum nudipes</i> (Fuckel) Nannf.	Nacktstieliges Haarbecherchen	VU	D1		
<i>Lachnum pygmaeum</i> (Fr.) Bres.	Zwerg-Haarbecherchen	VU	D1		
<i>Lachnum rhytismatis</i> (Phill.) Nannf.	Weißes Blatthaarbecherchen	NT			
<i>Lacrymaria pyrotricha</i> (Holmsk.)	Feuerfarbener Saumpilz	VU	D1		nährstoffreiche, ruderales Standorte
<i>Lactarius acerrimus</i> Britzelm.	Queraderiger Milchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius aspideus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Schild-Milchling	EN	B1ab(iii)		sumpfige Orte
<i>Lactarius azonites</i> (Bull.) Fr.	Rauchfarbener Milchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius bertillonii</i> (Neuhoff ex Z.Schaeff.) Bon	Scharfmilchender Wollschwamm	EN	D1		
<i>Lactarius citriolens</i> Pouzar	Fransen-Milchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius controversus</i> Pers.:Fr.	Rosascheckiger Milchling	VU	D1		In Pappelforsten
<i>Lactarius dryadophilus</i> Kuehner	Silberwurz-Milchling	EN	D1		alpine Art, kalkreiche Böden
<i>Lactarius fascians</i> Fr.	Verhexter Milchling	CR	A4ac		keine Funde seit 1988
<i>Lactarius flavidus</i> Boud.	Hellgelber Violett-Milchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius flexuosus</i> (Pers.:Fr.) Gray	Verbogener Milchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius glaucescens</i> Crossl.	Grünender Pfeffermilchling	VU	B1ab(iii)		
<i>Lactarius helvus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Bruchreizker, Maggipilz	VU	B1ab(iv)		In Mooren
<i>Lactarius hepaticus</i> Plowr.	Leberbrauner Milchling	VU	B2ab(iii)		saure, nährstoffarme Böden
<i>Lactarius hysginus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	Kuhroter Milchling	VU	D1		
<i>Lactarius lacunarum</i> (Romagn.) ex Hora	Pfützen-Milchling	VU	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
Lactarius luteolus Peck	Weisser Milchbrätling	CR	A4ac		nur in Tessin gefunden, letzte Fundmeldung 1980
Lactarius mairei Malencon	Braunzottiger Milchling	EN	B1ab(iii)+D1		
Lactarius mammosus Fr.	Dunkler Duftmilchling	VU	B1ab(iii)		
Lactarius musteus Fr.	Heide-Milchling	EN	D1		
Lactarius omphaliformis Romagn.	Moos-Milchling	VU	B1ab(iv)		In Schwarzerlenbruchwäldern
Lactarius quieticolor Romagn.	Brauner Kiefernblutreizker	EN	B1ab(iii)+D2		
Lactarius repraesentaneus Britzelm.	Violettmilchender Zottenreizker	VU	B1ab(iii,iv)		
Lactarius resimus (Fr.: Fr.) Fr.	Wimpern-Milchling	EN	D1		
Lactarius romagnesii Bon	Schwarzbrauner Milchling	VU	B1ab(iii)		
Lactarius rostratus Heilmann-Clausen	Runzeliger Zwergmilchling	VU	B2ab(iii)		
Lactarius ruginosus Romagn.	Weitblättriger Korallen-Milchling	NT			
Lactarius salicis-herbaceae Kuehner	Weiden-Milchling	VU	D1		alpine Art
Lactarius salicis-reticulatae Kuehner	Netzweiden-Milchling	EN	D1		alpine Art
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr.	Weinroter Kiefern-Blutreizker	NT			
Lactarius scoticus Berk. et Broome	Flaumiger Moor-Milchling	VU	D1		Möglicherweise mit L. pubescens verwechselt
Lactarius semisanguifluus R. Heim et Lecl.	Spangrüner Kiefernreizker	NT			Jura-Art
Lactarius serifluus (DC.: Fr.) Fr.	Wäßriger Milchling	VU	B1ab(iii)		
Lactarius spinosulus Quel.	Schüppchen-Milchling	EN	D1		
Lactarius subumbonatus Lindgr.	Wäßriger Milchling	EN	B1ab(iii)		
Laricifomes officinalis (Vill.:Fr.) Kotl.et Pouzar	Lärchen-Baumschwamm	VU	B1ab(iv)	§ ^{CH}	An Lärchen
Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer	Harter Pappel-Rauhfuß	VU	B1ab(iii,iv)+B2ab(iv)+D1		
Leccinum holopus (Rostk.) Watling	Moor-Birkenpilz	VU	B1ab(iii,iv)+B2ab(iii)		
Leccinum melaneum (Smotl.) Pilat et Derm.	Schwarzbrauner Birkenpilz	NT			
Leccinum molle (Bon) Bon	Schwammiger Rauhstielröhrling	VU	D1		
Leccinum piceinum Pilat et Dermek	Fichten-Rotkappe	EN	D1		
Leccinum quercinum Pilat	Eichen-Rotkappe	VU	B1ab(iii,iv)+B2ab(iii)		
Leccinum roseofractum Watling	Zigarrenbrauner Rauhstielröhrling	NT			
Leccinum tessulatum (O.Kuntze) Rauschert	Gelber Rauhfuß	VU	B1ab(iii,iv)+D1		
Leccinum versipelle (Fr.) Snell	Heide-Rotkappe	NT			
Leccinum vulpinum Watling	Kiefern-Rotkappe	EN	B1ab(iii)		
Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres.	Becherförmiger Sägeblätling	EN	D1		
Lenzites warnieri Durieu et Mont. In Mont.	Verkahlender Blätling	EN	D1		
Lepiota alba (Bres.) Sacc.	Weißer Schirmling	VU	B1ab(iv)		
Lepiota echinacea J.E. Lange	Igel-Schirmling	VU	B1ab(iv)+C1		
Lepiota fuscovinacea J.E. Lange et F.H. Moeller	Purpurbrauner Schirmling	NT			
Lepiota grangei (Eyre) J.E. Lange	Grünschuppiger Schirmling	NT			
Lepiota griseovirens Maire	Graugrüner Schirmpilz	VU	D2		
Lepiota hystrix F.H. Moeller et J.E. Lange	Kegelschuppiger Schirmling	VU	B1ab(iv)		
Lepiota ignicolor Bres.	Feuerfarbener Schirmpilz	EN	D1		
Lepiota lilacea Bres.	Lila Schirmpilz	EN	B1ab(iv)		
Lepiota ochraceofulva P.D. Orton	Ockerbrauner Schirmpilz	VU	D2		
Lepiota oreadiformis Velen.	Ockerblasser Schirmling	EN	B1ab(ii,iii)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Lepiota parvannulata</i> (Lasch) Gillet	Kleinberingter Schirmling	EN	B1ab(ii,iii,iv)		
<i>Lepiota pseudoasperula</i> (Knudsen) Knudsen	Kleinster Stachelschirmling	EN	B1ab(iv)+D1		
<i>Lepiota pseudofelina</i> J.E. Lange	Falscher Schwarzschnuppen-Schirmling	EN	B1ab(iv)+D1		
<i>Lepiota subalba</i> Kuehner ex P.D. Orton	Fastweisser Schirmpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Lepiota tomentella</i> J.E. Lange	Schwachfilziger Schirmling	EN	D1		
<i>Lepista caespitosa</i> (Bres.) Singer	Büscheliger Rötleritterling	VU	B1ab(iv)		
<i>Lepista densifolia</i> (J. Favre) Singer et Clemencón	Dichtblättriger Rötleritterling	VU	D1		periodisches Auftreten
<i>Lepista ricekii</i> Bon	Scharfer Rötleritterling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Lepista rickenii</i> Singer	Marmorierter Rötleritterling	VU	B1ab(iii,iv)+B2ab(ii)		
<i>Leptoporus mollis</i> (Pers.: Fr.) Pilat	Rötender Saftporling	VU	B1ab(iv)		
<i>Leptosporomyces mutabilis</i> (Bres.) L.G. Krieglst.	Veränderliche Gewebehaut	NT			wieso diese Abnahme?
<i>Leucoagaricus badhamii</i> (Berk. et Broome) Singer	Anlaufender Egerlingsschirmpilz	EN	D1		
<i>Leucoagaricus bresadolae</i> (Schulzer) Bon	Rötender Egerlingsschirmpilz	VU	D1		
<i>Leucoagaricus pulverulentus</i> (Huijism.) Moser	Pulveriger Schirmpilz	EN	B1ab(iv)		
<i>Leucoagaricus wichanskyi</i> (Pilat) Singer	Robuster Egerlingsschirmpilz	VU	D2		im Tessin
<i>Leucopaxillus macrocephalus</i> (Schulz.) Bohus	Grosser Krepentrichterling	CR	D1		an xerothermen Standorten
<i>Leucopaxillus mirabilis</i> (Bres.) M.M. Moser	Schöner Krepentrichterling	VU	B1ab(iv)+C2a(i)		
<i>Leucopaxillus pinicola</i> J. Favre	Kiefern-Krepentrichterling	CR	A2a		
<i>Leucopaxillus rhodoleucus</i> (Romell) Kuehner	Lachsblättriger Krepentrichterling	EN	D1		
<i>Limacella delicata</i> (Fr.) Earle ex H. V. Smith	Zarter Schleimschirmling	EN	D1		
<i>Limacella vinosorubescens</i> Furrer-Ziogas	Weinroter Schleimschirmling	VU	B1ab(iv)		
<i>Litschauerella clematidis</i> (Bourdout et Galzin) J. Erikss. et Ryvarden	Waldreben-Zystidenrindenpilz	VU	D1		
<i>Lobulicium occultum</i> K.H. Larss. et Hjortstam	Fleckenpilz	CR	D1		
<i>Lycoperdon altimontanum</i> Kreisel	Hochgebirgs-Stäubling	EN	D2		alpine Art
<i>Lycoperdon decipiens</i> Durieu et Mont.	Steppen-Stäubling	VU	D2		
<i>Lycoperdon ericaeum</i> Bonord.	Heide-Stäubling	EN	B1ab(iv)		Letzte Fundmeldung 1992
<i>Lycoperdon frigidum</i> Demoulin	Zwergweiden-Stäubling	VU	D1		alpine Art
<i>Lycoperdon lividum</i> Pers.	Blasser Stäubling	VU	B1ab(iii,iv)		teilweise alpine Standorte
<i>Lycoperdon mammiforme</i> Pers.	Flocken-Stäubling	VU	D1		
<i>Lyophyllum favrei</i> R.Haller et R.Haller	Favres Schwärzling	VU	B1ab(iii)	§ ^{CH}	
<i>Lyophyllum incarnatobrunneum</i> Gerhardt	Fleischbräunlicher Rasling	VU	D1		
<i>Lyophyllum macrosporium</i> Singer	Grosssporiger Rasling	EN	B1ab(iv)		feuchtes Grasland, selten
<i>Lyophyllum ochraceum</i> (Haller) Schwoebel et Reutter	Ockerfarbener Schwärzling	EN	D1		
<i>Lyophyllum tenebrosum</i> Clemencón	Dunkler Rasling	VU	D1		
<i>Macrolepiota heimii</i> (Locquin ex) Bon in Bellu	Heims Riesenschirmling	EN	D1		In mageren Wiesen
<i>Macrolepiota olivascens</i> M.M. Moser in M.M. Moser et Singer	Grünfleckender Riesenschirmling	VU	D2		
<i>Macrolepiota permixta</i> Barla	Rötender Riesenschirmling	VU	D2		
<i>Macrolepiota puellaris</i> (Fr.) M.M. Moser	Jungfern-Schirmling	VU	D1		vor allem in Graubünden
<i>Macrolepiota venenata</i> Bon	Gift-Schirmling	EN	D1		
<i>Macrotyphula tremula</i> Berthier	Röhrenkeule	VU	D1		wohl übersehen

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Marasmiellus candidus</i> Bolt.:Fr.	Weißer Zwergschwindling	EN	B1ab(iv)+ B2ab(iv)+D1		
<i>Marasmiellus tricolor</i> (Alb. et Schwein.ex Fr.) Singer	Dreifarbiger Astschwindling	EN	D1		mageres Grasland
<i>Marasmius anomalus</i> Lasch	Braunscheibiger Schwindling	EN	B1ab(iii)		Trockenwiesen
<i>Marasmius buxi</i> Quel.	Buchsblatt-Schwindling	EN	D1		an Buchsblättern, durch gezielte Suche eventuell mehr Standorte
<i>Marasmius capillipes</i> Sacc.	Pappelblatt-Schwindling	VU	D2		
<i>Marasmius chordalis</i> Fr.	Rotfleckiger Schwindling	EN	B1ab(iv)+C1i()		
<i>Marasmius collinus</i> (Scop.ex Fr.) Singer	Hügel-Schwindling	EN	B1ab(iv)		
<i>Marasmius epidryas</i> Kuehner	Silberwurz-Schwindling	EN	D1		alpin, an Silberwurz
<i>Marasmius graminum</i> (Libert) Berk.	Orangerötlicher Schwindling	VU	B1ab(iv)		Magere Rasen, auch (oder vor allem?) im Siedlungsbereich
<i>Marasmius hudsonii</i> (Pers.ex Fr.) Fr.	Stechpalmen-Schwindling	CR	D1		Bei ganz gezielter Suche eventuell mehr Standorte
<i>Marasmius limosus</i> Boud. et Quel.	Schilf-Schwindling	NT			Eventuell übersehen
<i>Marasmius quercophilus</i> Pouzar	Gedrängtblättriger Schwindling	EN	B1ab(iv)		
<i>Marasmius saccharinus</i> (Batsch) Fr.	Netzaderiger Schwindling	EN	B1ab(iv)+C2a(i)		
<i>Marasmius scorodonius</i> (Fr.) Fr.	Küchen-/Knoblauch-Schwindling, Mousseron	NT			eventuell abnehmend
<i>Marasmius tenuiparietalis</i> Singer	Leistenblättriger Schwindling	VU	D1		
<i>Marasmius tremulae</i> Velen.	Pappel-Schwindling	CR	D1		
<i>Melanoleuca subpulverulenta</i> (Pers.) Metr.	Bereifter Weichritterling	VU	D1		
<i>Melanophyllum eyrei</i> (Mass.) Singer	Grünblättriger Zwergschirmling	CR	D1		
<i>Melanotus phillipsii</i> (Berk. et Broome.) Singer	Dunkelstieliger Krüppelfuß	VU	D1		
<i>Membranomyces spurius</i> (Bourdot) Juelich	Gelber Hautrindenpilz	VU	D1		
<i>Metulodontia nivea</i> (Karst.) Parmasto	Weisser Lamprosporenzystidenschwamm	VU	D1		
<i>Microglossum viride</i> (Pers. ex Fr.) Gillet	Grüne Erdzunge	EN	D1		
<i>Mitula paludosa</i> Fr.	Sumpf-Haubenpilz	NT			in Hochmooren und Erlenbrüchen
<i>Mollisia lividofusca</i> (Fr.: Fr.) Gillet	Schwarzweißes Filzbecherchen	NT			
<i>Mollisia palustris</i> (Roberge) P. Karst.	Binsen-Filzbecherchen	VU	D1		
<i>Mollisia ramealis</i> (P. Karst.) P. Karst.	Ast-Weichbecherchen	NT			
<i>Mucronella calva</i> (Alb. et Schwein.) Fr.	Rasiges Pfriem-Pilzchen	VU	D1		
<i>Mycena adonis</i> (Bull.: Fr.) S.F.Gray	Korallenroter Helmling	VU	B1ab(iv)		
<i>Mycena adscendens</i> (Lasch) Maas Geest.	Zarter Helmling	VU	D2		
<i>Mycena alphetophora</i> (Berk.) Sacc.	Königsfarn-Helmling	EN	D1		an Rinde
<i>Mycena avenacea</i> (Fr.) Quel.	Braunschneidiger Helmling	EN	D1		in Wiesen, Rasen
<i>Mycena clavicularis</i> (Fr.) Gillet	Grosser Schleimfuss-Helmling	EN	D1		
<i>Mycena fagetorum</i> (Fr.) Gillet	Buchen-Helmling	CR	A3a		Letzter Fund 1983
<i>Mycena favrei</i> Maas-Geest.	Favre Helmling	CR	D1		
<i>Mycena floridula</i> (Fr.) Quel.	Glasstiel-Helmling	EN	D1		
<i>Mycena grisellina</i> J. Favre	Hellgrauer Helmling	CR	D1		nach Maas Geesteranus nur aus der Schweiz bekannt
<i>Mycena latifolia</i> (Peck) Sacc.	Breitblättriger Helmling	CR	D1		
<i>Mycena mucor</i> (Batsch ex Fr.) Gillet	Gefalteter Helmling	CR	D1		
<i>Mycena niveipes</i> Murrill	Großer Frühlings-Helmling	VU	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Mycena olida</i> Bres.	Ranziger Rindenhelmling	VU	D1		
<i>Mycena olivaceomarginata</i> (Massee ap. Cke) Massee	Braunschneidiger Helmling	VU	B1ab(iv)		
<i>Mycena pearsoniana</i> Dennis ex Singer	Fleischfarbener Helmling	EN	D1		Vor allem in Grünerlengebüsch
<i>Mycena pseudopicta</i> (J.E. Lange) Kuehner	Fastbeschränkter Helmling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Mycena purpureofusca</i> (Peck.) Sacc.	Lilaschneidiger Helmling	EN	B1ab(iv)		
<i>Mycena smithiana</i> Kuehner	Leichtvergänglicher Eichen-Helmling	CR	A3a		Letzte Fundmeldung 1984, übersehen?
<i>Mycena urania</i> (Fr.) Quel.	Dünnstieliger Helmling	EN	D1		
<i>Mycenella favreana</i> E. Horak	Favre Reifhelmling	CR	D1		alpin-subalpine Art
<i>Mycenella margaritospora</i> (J.E. Lange) Singer	Perlsporiger Reifhelmling	VU	D1		
<i>Mycenella trachyspora</i> (Rea) Bon	Reifhelmling	EN	D1		
<i>Mycocacia aurea</i> (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden	Goldgelber Fadenstachelpilz	NT			
<i>Myriosclerotinia sulcata</i> (Whetzel) Buchwald	Seggen-Sklerotienbecherling	VU	D1		
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks. ex Pers.) Corda	Sieb-Erdstern	CR	A1ac		Viele Jahre verschollen, Südalpen
<i>Mytilodiscus alnicola</i> Kropp et Carp.	Grünerlen-Muschelbecherling	NT			an <i>Alnus viridis</i>
<i>Naucoria alnetorum</i> (Maire) Kuehner et Romagn.	Zweisporiger Sumpfschnitzling	VU	B1ab(iii)		
<i>Naucoria amarescens</i> Quel.	Bitterer Schnitzling	NT			Brandstellen
<i>Naucoria bohémica</i> Velen.	Weißstieliger Erlenschnitzling	EN	D1		
<i>Naucoria subconspersa</i> Kuehner	Behängener Schnitzling	NT			
<i>Neottiella rutilans</i> (Fr.: Fr.) Dennis	Rotes Mooschälchen	VU	D1		bis in alpine Stufe
<i>Neottiella vivida</i> (Nyl.) Dennis	Warzigsporiges Mooschälchen	VU	D1		
<i>Octavianina asterosperma</i> (Vittad.) Kuntze	Sternsporige Laubtrüffel	VU	D1		
<i>Octospora phagospora</i> (Flageolet et Lorton) Dennis et Itzerott	Viersporiges Zwerg-Moosbecherchen	VU	D1		
<i>Omphalina fusconigra</i> P.D. Orton	Schwarzbrauner Nabeling	CR	D1		In Mooren
<i>Omphalina griseopallida</i> (Desm.) Quel.	Graufilziger Adermoosling	VU	D1		auch alpine Art
<i>Omphalina obscurata</i> D.A. Reid	Graubrauner Nabeling	EN	D1		
<i>Omphalina oniscus</i> (Fr.: Fr.) Quel.	Rußiger Moor-Nabeling	VU	B1ab(iii)		In Mooren
<i>Omphalina philonotis</i> (Lasch ex Fr.) Quel.	Blasser Sumpf-Nabeling	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Omphalina pyxidata</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Scherbenbrauner Nabeling	VU	B1ab(iii)		sandige Stellen, trittgefährdet
<i>Omphalina rivulicola</i> (J. Favre) Lamoure	Bach-Nabeling	NT			
<i>Omphalina rustica</i> (Fr.) Quel.	Dickblättriger Heide-Nabeling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Omphalina sphagnicola</i> (Berk.) M.M. Moser	Torfmoos-Nabeling	EN	D1		
<i>Omphalotus olearius</i> (DC ex Fr.) Singer	Leuchtender Ölbaumpilz	EN	D1		wird wahrscheinlich von Klimaerwärmung profitieren!
<i>Onnia triqueter</i> (Lenz) Imaz.	Kiefern-Filzporling	VU	B1ab(iv)		
<i>Ossicaulis lignatilis</i> (Pers.: Fr.) Redhead et Ginns 1985	Holztrichterling	VU	D1		
<i>Otidea alutacea</i> (Pers.) Massee	Ledergelber Öhring	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Otidea bufonia</i> (Pers.) Boud.	Kröten-Oehrling	EN	D1		
<i>Otidea leporina</i> (Batsch) Fuckel	Hasenohr	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Oxyporus latemarginatus</i> (Durieu et Mont. ex Mont.) Donk	Breitrandiger Steifporling	EN	A4a		Letzte Fundmeldung 1992

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Oxyporus obducens</i> (Pers.:Fr.) Donk	Krustenförmiger Steifporling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Pachykytospora tuberculosa</i> (DC.: Fr.) Kotl.et Pouzar	Rauhsporiger Resupinatporling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D1		
<i>Panaeolus acuminatus</i> (Schaeff.) Quel.	Kegeliger Düngerling	VU	B1ab(iv)+D1		
<i>Panaeolus cinctulus</i> Bolton	Dunkelrandiger Düngerling	VU	D1		
<i>Panaeolus fontinalis</i> A.H.Sm.	Moor-Düngerling	EN	B1ab(iv)		
<i>Panaeolus guttulatus</i> Bres.	Getropfter Düngerling	VU	B1ab(iii)		
<i>Panaeolus olivaceus</i> Moeller	Punktiersporiger Düngerling	VU	D1		
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overholts	Kleinsporiger Düngerling	VU	D1		in Feuchtwiesen
<i>Panaeolus retirugis</i> (Fr.) Quel.	Runzeliger Düngerling	VU	D1		
<i>Panellus ringens</i> (Fr.) Romagn.	Glockenknäuling	VU	D2		
<i>Panus suavissimus</i> (Fr.) Singer	Anis-Sägeblättling	EN	D1		an Laubholz
<i>Panus tigrinus</i> (Bull.: Fr.) Singer	Getigeter Sägeblättling	VU	B1ab(iv,iii)		
<i>Paulliticium niveocreum</i> (Hoehn. et Litsch.) Oberw.	Cremeweisser Multisterigmenpilz	VU	D2		
<i>Paxillus panuoides</i> Fr.	Muschel-Krempling	NT			
<i>Peniophora piceae</i> (Pers.) J. Erikss.	Tannen-Rindenpilz	VU	D1		
<i>Peniophora pini</i> (Schleich) Boidinss.	Kiefern-Zystidenrindenpilz	CR	B1ab(iii) + D1		an Föhren, speziell <i>Pinus mugo</i>
<i>Peniophora polygonia</i> (Fr.) Bourdot et Galzin	Espen-Rindenpilz	EN	B1ab(iv)		
<i>Peniophora proxima</i> Bres.	Buchs-Zystidenrindenpilz	EN	D1		An altem Buchs
<i>Peniophora violaceolivida</i> (Sommerf.) Masee	Violetter Zystidenrindenpilz	EN	D2		
<i>Perenniporia medullapanis</i> (Fr.) Donk	Ockerfarbener Dauerporling	VU	B1ab(iv)		starke Abnahme, Verlust von Standorten
<i>Peziza limnaea</i> Maas-Geest.	Schlamm-Becherling	VU	B1ab(iv)		
<i>Peziza moravecii</i> (Svrcek) Donadini	Moravecscher Kotbecherling	VU	D1		
<i>Phaeocollybia arduennensis</i> Bon	Kleiner Wurzelschnitzling	VU	D1		
<i>Phaeocollybia cidaris</i> (Fr.) R. Heim	Fuchsiger Wurzelschnitzling	EN	B1ab(iv)		
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	Olivgrüner Wurzelschnitzling	EN	D1		
<i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karst.) R. Heim	Kleiner Wurzelschnitzling	EN	D1		
<i>Phaeogalera oedipus</i> (Cooke) Romagn.	Blätter-Scheinschüppling	VU	D1		
<i>Phaeogalera stagnina</i> (Fr.) Kuehner	Geschmückter Häubling	EN	D1		auch alpin
<i>Phaeohelotium monticola</i> (Berk.) Dennis	Braunsporiger Stengelbecherchen	NT			
<i>Phaeomarasmius erinaceus</i> (Fr.) Kuehner	Igel-Schüppchenschnitzling	VU	B1ab(iv)+C2a(i)		
<i>Phallogaster saccatus</i> Morgan	Beutelförmige Gallertnuß	VU	D1		
<i>Phallus hadriani</i> Vent.ex Pers.	Dünen-Stinkmorchel	VU	D1		Südalpen, adventiv?
<i>Phanerochaete leprosa</i> (Bourdot et Galzin) Juelich	Warziger Zystidenrindenschwamm	VU	D1		nur aus Tessin nachgewiesen, an Laubholz
<i>Phanerochaete martelliana</i> (Bres.) J. Erikss. et Ryvarde	Grosssporiger Zystidenrindenpilz	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D1		Art der Südalpen
<i>Phellinus chrysoloma</i> (Fr.) Donk	Fichten-Feuerschwamm	VU	B1ab(iv)		
<i>Phellinus contiguus</i> (Pers.: Fr.) Pat.	Zusammenhängender Feuerschwamm	NT			dramatische Abnahme!
<i>Phellinus ferrugineofuscus</i> (P. Karst.) Bourdot et Galzin	Rostrotrandiger Feuerschwamm	EN	B1ab(iv)		
<i>Phellinus hippophaecola</i> H. Jahn	Sanddorn-Feuerschwamm	VU	D1		an altem Sanddorn

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Phellinus laevigatus</i> (Fr. ex P. Karst.) Bourdot et Galzin	Glatter Feuerschwamm	VU	D1		im Tessin offensichtlich häufig
<i>Phellinus lundellii</i> Niemelae	Lundells Feuerschwamm	EN	D1		
<i>Phellinus nigricans</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Schwarzer Birken-Feuerschwamm	EN	D1		
<i>Phellinus nigrolimitatus</i> (Romell) Bourdot et Galzin	Dunkelgezonter Feuerschwamm	EN	B1ab(iv,iii)		Bergnadelwald, Urwaldzeiger
<i>Phellinus pini</i> (Brot.: Fr.) L.M. Ames	Kiefern-Feuerschwamm	CR	D1		
<i>Phellinus rhamni</i> (Bondartsev) H. Jahn	Faulbaum-Feuerschwamm	EN	D1		nur Tessin!
<i>Phellinus torulosus</i> (Pers.) Bourdot et Galzin	Rotporiger Feuerschwamm	CR	D1		Art am Rand des Verbreitungsareals
<i>Phellinus tremulae</i> (Bondartsev) Bondartsev et Borissov	Espen-Feuerschwamm	VU	D1		ganze Schweiz, aber überall selten, alte Pappeln
<i>Phellinus viticola</i> (Schwein.: Fr.) Donk	Dünner Feuerschwamm	CR	D1		
<i>Phellinus vorax</i> (Harkn.) Cerny	Goldrandiger Feuerschwamm	VU	B1ab(iv)		
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	Starkriechender Duftstacheling	VU	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		
<i>Phellodon melaleucus</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Schwarzweißer Duftstacheling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Phellodon niger</i> (Fr.: Fr.) P. Karst.	Schwarzer Duftstacheling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Phlebiella pseudotsugae</i> (Burt) K.H. Larss. et Hjortstam	Douglasien-Faserrandwachshaut	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D1		Pilz der Südalpen
<i>Pholiota alnicola</i> (Fr.) Singer	Erlen-Schüppling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Pholiota cerifera</i> (P. Karst.) P. Karst.	Goldfell-Schüppling	NT			
<i>Pholiota conissans</i> (Fr.) M.M. Moser	Gras-Schüppling	NT			
<i>Pholiota henningsii</i> (Bres.) P.D. Orton	Torfmoos-Schüppling	CR	D1		viele Jahre ohne Nachweise, nun wieder mit einem Fund aus dem Pfäffikerriet von 2004 belegt
<i>Pholiota heteroclita</i> (Fr.) Quel.	Abweichender Schüppling	EN	B1ab(iv)		
<i>Pholiota jahonii</i> Tjall.-Beuk. et Bas	Pinself-Schüppling	NT			
<i>Pholiota limonella</i> (Peck) Sacc.	Intermediärer Schüppling	EN	B1ab(iv)		
<i>Pholiota lucifera</i> (Lasch) Quel.	Fettiger Schüppling	VU	B1ab(iv)		
<i>Pholiota myosotis</i> (Fr.) Singer	Sumpf-Schwefelkopf	VU	D1		
<i>Pholiota nematolomoides</i> (J. Favre) M.M. Moser	Schwefelkopfähnl. Schüppling	VU	D1		ein seltener montaner Pilz
<i>Pholiota spumosa</i> (Fr.) Singer	Zweifarbiger Schüppling	NT			
<i>Pholiota tuberculosa</i> (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.	Rötender Schüppling	VU	D1		
<i>Pholiotina aeruginosa</i> (Romagn.) Moser	Grünspan-Glockenschüppling	EN	D1		
<i>Pholiotina cyanopus</i> (G.F. Atk.) Singer	Blaufuss-Samthäubchen	EN	D1		Adventive Art? Letzter Fund 1986
<i>Pholiotina striaepes</i> (Cooke) Lundell	Weißstieliges Samthäubchen	NT			wieso keine neueren Funde?
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	Goldblatt	NT			
<i>Picoa carthusiana</i> Tul.	Karthäusertrüffel	VU	D1		
<i>Pithya cupressina</i> (Batsch ex Fr.) Fuckel	Orangegelber Wacholderbecherling	VU	D1		
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby: Fr.) Fuckel	Schwarzzündiger Flechtbecherling	EN	D1		
<i>Pleurocybella porrigens</i> (Pers.:Fr.) Singer	Ohrförmiger Seitling	VU	B1ab(iv);C2a(i)		
<i>Pleurotus cornucopiae</i> Paul.:Fr.	Rillstieliger Seitling	VU	B1ab(iv)		
<i>Pleurotus dryinus</i> (Pers.:Fr.) P. Kumm.	Berindeter Seitling	NT			

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.: Fr.) Quel.	Kräuter-Seitling	EN	B1ab(ii,iii)		unbeschriebene Varietät des Alpenbogens
<i>Pleurotus pulmonarius</i> Fr.	Cremeweißer Seitling	NT			
<i>Plicaria anthracina</i> (Cooke) Boud.	Brandstellen-Becherling	NT			
<i>Pluteus aurantiorugosus</i> (Trog.) Sacc.	Orangeroter Dachpilz	EN	B1ab(iv,iii)	§ ^{CH}	
<i>Pluteus chrysophaeus</i> (Schff.:Fr.) Quel.	Zimtfarbiger Dachpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Pluteus cyanopus</i> (Quel.) Metrod	Blaustieliger Dachpilz	EN	B1ab(iv)+D1		
<i>Pluteus ephebeus</i> (Fr.: Fr.) Gillet	Sepiabrauner Samt-Dachpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Pluteus granulatus</i> Bres.	Körniger Dachpilz	CR	D1		
<i>Pluteus hiatulus</i> Romagn.	Dünnfleischiger Dachpilz	CR	D1		
<i>Pluteus luctuosus</i> Boud.	Braunschneidiger Dachpilz	VU	B1ab(iv)+D1		
<i>Pluteus mammifer</i> Romagn.	Gebuckelter Dachpilz	VU	D1		
<i>Pluteus minutissimus</i> Maire	Mehlstieler Dachpilz	VU	B1ab(iv)+D1		
<i>Pluteus pellitus</i> (Pers.:Fr.) P. Kumm.	Weißer Dachpilz	EN	D1		
<i>Pluteus phlebophorus</i> (Ditm.:Fr.) Kumm.	Netzaderiger Zwerg-Dachpilz	NT			
<i>Pluteus poliocnemis</i> Kuehner	Runzeliger Dachpilz	CR	D1		
<i>Pluteus pseudorobertii</i> M.M. Moser et Stangl	Grauschuppiger Dachpilz	EN	B1ab(iv)		
<i>Pluteus thomsonii</i> (Berk. et Broome) Dennis	Graustieliger Adern-Dachpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Pluteus umbrosus</i> (Pers.:Fr.) P. Kumm.	Schwarzflockiger Dachpilz	NT			
<i>Polyporus arcularius</i> (Batsch: Fr.) Fr.	Weitlöcheriger Porling	NT			
<i>Polyporus rhizophilus</i> (Pat.) Sacc.	Steppenporling	EN	B1ab(ii,iii)+D1		An der Basis von Steppengräsern (<i>Stipa</i>)
<i>Poronia punctata</i> (L.:Fr.) Fr.	Punktierete Porenscheibe	CR	D1		
<i>Porpoloma metapodium</i> (Fr.) Singer	Schwärzender Wiesenritterling	VU	B1ab(iii,iv)+C2a(i)		
<i>Porpoloma pescaprae</i> (Fr.) Singer	Spitzhütiger Wiesenritterling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Porpoloma spinulosum</i> (Kuehner. et Romagn.) Singer	Borstiger Wiesenritterling	CR	D1		
<i>Protodontia piceicola</i> (Kuehner ex Bourdot) Martin	Gallertiger Resupinatstacheling	VU	D1		
<i>Psathyrella canoceph</i> (C.H.Kauffm.) A.H.Smith	Haariger Faserling	VU	D1		
<i>Psathyrella caputmedusae</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	Medusenhaupt	VU	D1		
<i>Psathyrella cernua</i> (Vahl:Fr.) Hirsch	Ausblassender Faserling	VU	B1ab(iv)		
<i>Psathyrella chondroderma</i> (Berk. et Broome) A.H.Smith	Netziger Faserling	VU	B1ab(iv)+D1		
<i>Psathyrella cotonea</i> (Quel.) Konrad et Maubl.	Schwefelfüßiger Faserling	VU	B1ab(iv)+D1		Mittellandpilz
<i>Psathyrella fatua</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	Tonblasser Faserling	NT			
<i>Psathyrella friesii</i> Kits van Wav.	Gefurchter Faserling	EN	B1ab(iv)		
<i>Psathyrella leucotephra</i> (Berk.et Broome) P.D. Orton	Ringfaserling	NT			
<i>Psathyrella pennata</i> (Fr.) Singer	Kohlen-Faserling	VU	D1		
<i>Psathyrella populina</i> (Britzelm.) Kitsv.Wav.	Schwarzgestreifter Faserling	NT			
<i>Psathyrella sacchariolens</i> Enderle nom.prov.	Süßriechender Faserling	VU	D1		
<i>Psathyrella spadicea</i> (Fr.) Singer	Schokoladenbrauner Faserling	VU	B1ab(iv)		
<i>Psathyrella sphagnicola</i> Maire	Moor-Zärtling	EN	B1ab(iii,iv)		an <i>Sphagnum</i> in offenen Hochmoorflächen
<i>Psathyrella spintrigera</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	Dattelbrauner Faserling	VU	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Psathyrella typhae</i> (Kalchbr.) Pearson et Dennis	Halm-Faserling	EN	D1		Halmen von Schilf und grossen Seggen
<i>Pseudoclitocybe obbata</i> (Fr.) Singer	Dunkler Gabeltrichterling	EN	B1ab(ii,iii)		
<i>Pseudombrophila theioleuca</i> Rolland	Schwefelgelber Dungbecherling	NT			
<i>Pseudomerulius aureus</i> (Fr.) Juelich	Goldgelber Fältling	EN	A4b		an sonnigen Stellen, auch Zaunpfähle nach Lit.; letzte Fundmeldung 1995
<i>Pseudoomphalina kalchbrenneri</i> (Bres.) Singer	Kalchbrenners Scheinnabeling	VU	D2		in Nadelstreu
<i>Pseudoplectania vogesiaca</i> (Pers.) Seav.	Gestielter Schwarzborstling	EN	D1		
<i>Pseudorhizina sphaerospora</i> (Peck) Pouzar	Nadelholz-Scheinlorchel	EN	D1		
<i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.: Fr.) Quel.	Mist-Kahlkopf	VU	B1ab(iv)		
<i>Psilocybe inquilina</i> (Fr.: Fr.) Bres.	Klebhaut-Kahlkopf	NT			
<i>Psilocybe turficola</i> J. Favre	Torf-Kahlkopf	NT			In Mooren
<i>Psilocybe velifera</i> J. Favre	Behangener Kahlkopf	CR	D1		in Polstern von <i>Carex firma</i> , letzte Fundmeldung 1953
<i>Pulveroboletus gentilis</i> (Quel.) Singer	Goldporiger Röhrling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Pulveroboletus hemichrysus</i> (Berk. et M.A. Curtis) Singer	Schwefel-Röhrling	CR	A2a		Letzte Fundmeldung 1940; an moderigem Holz
<i>Pulveroboletus lignicola</i> (Kbch.) Pilat	Nadelholz-Röhrling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Ramaria abietina</i> (Pers.: Fr.) Quel.	Grünfleckende Koralle	NT			
<i>Ramaria apiculata</i> (Fr.) Donk	Grünspitzige Koralle	EN	B1ab(iii,iv)+D1		
<i>Ramaria aurea</i> (Schaeff.) Quel.	Goldgelbe Koralle	NT			
<i>Ramaria bataillei</i> (Maire) Corner	Batailles Koralle	VU	B1ab(iii)		
<i>Ramaria botrytis</i> (Pers.: Fr.) Ricken	Hahnenkamm	VU	B1ab(iii)		
<i>Ramaria broomei</i> (Cotton et Wakef.) R.H. Petersen	Broomes Bitter-Koralle	CR	D1		
<i>Ramaria curta</i> (Fr.) Schild	Kurzsporige Koralle	CR	D1		Letzte Fundmeldung 1979
<i>Ramaria eumorpha</i> (P. Karst.) Corner	Ockergelbe Koralle	NT			
<i>Ramaria flavescens</i> (Schaeff.) R.H. Petersen	Gelbliche Koralle	VU	B1ab(iii)		
<i>Ramaria flavobrunnescens</i> (G.F. Atk.) Corner	Gelbbraunende Koralle	EN	B1ab(iii,iv)+D1		
<i>Ramaria ignicolor</i> Bres.ex Corner	Feuerfarbene Koralle	VU	D1		
<i>Ramaria myceliosa</i> (Peck) Corner	Kurzsporige Koralle	VU	D2		
<i>Ramaria neoformosa</i> R.H. Petersen	Formosaähnliche Koralle	EN	D1		
<i>Ramaria roellinii</i> Schild	Steppen-Koralle	CR	A2ac		Letzte Fundmeldung 1965
<i>Ramaria sanguinea</i> (Pers.) Quel.	Blutrotfleckende Koralle	NT			
<i>Ramaria subbotrytis</i> (Coker) Corner	Schönfarbige Koralle	VU	D1		
<i>Ramaria suecica</i> (Fr.) Donk	Schwedische Koralle	NT			
<i>Ramaria testaceoflava</i> (Bres.) Corner	Ziegelgelbe Koralle	EN	D1		
<i>Ramariopsis pulchella</i> (Boud.) Corner	Hübsche Wiesenkeule	EN	B1ab(ii,iii)		im Grasland und grasigen Wäldern
<i>Resinicium furfuraceum</i> (Bres.) Parmasto	Kleiiger Harzzahn	VU	D2		
<i>Resupinatus kavinii</i> (Pilat) M.M. Moser	Dickblättriger Liliputseitling	NT			nur in Westschweiz!
<i>Rhizopogon obtextus</i> (Sprengel) R.Rauschert	Gelbbraunliche Wurzeltrüffel	VU	D1		
<i>Rhodocybe ardosiacae</i> E. Horak et Griesser	Blaustieliger Tellerling	EN	D1		Auenwald
<i>Rhodocybe caelata</i> (Fr.) Maire	Genabelter Tellerling	NT			
<i>Rhodocybe fallax</i> (Quel.) Singer	Weißlicher Bitterling	EN	B1ab(iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
Rhodocybe hirneola (Fr.: Fr.) P.D. Orton	Glänzender Tellerling	EN	Biab(iv)		Nur Unterengadin und ein Fund aus dem Tessin, letzter Fund 1987
Rhodocybe melleopallens P.D. Orton	Honiggelber Tellerling	EN	D1		
Rhodocybe popinalis (Fr.) Singer	Bereifter Tellerling	VU	B1ab(iii,iv)		
Rhodocybe stangliana (Bresinsky et Pfaff) Rioussel et Joss.	Knolliger Tellerling	EN	B1ab(iv)		Fichtenwald
Rhodoscypa ovilla (Peck) Dissing et Sivertsen	Rosafarbiger Weißhaarbecherling	VU	D1		
Rhytisma salicinum (Pers.) Fr.	Weiden-Runzelschorf	EN	B1ab(iv)+D1		an Weidenblättern
Rickenella mellea (Singer et Cleménçon) Lamoure	Honigbrauner Hefelnabeling	VU	D1		alpine Art
Ripartites albidoincarnata (Britzelm.) Konr. et Maubl.	Fleischrosafarbener Filzkrempling	CR	A2a		Letzte Fundmeldung 1974
Ripartites serotinus Einhell.	Später Filzkrempling	CR	A2a		Letzte Fundmeldung 1965
Russula amoenicolor Romagn.	Brätlings-Täubling	EN	D1		
Russula amoenolens Romagn.	Camembert-Täubling	VU	B1ab(iii)		
Russula anatina Romagn.	Enten-Täubling	EN	D1		
Russula brunneoviolacea Crawsh.	Violettbrauner Samt-Täubling	EN	D1		
Russula carminipes Blum	Bereifter Ledertäubling	EN	D1		
Russula cicatricata Romagn.	Olivbrauner Heringstäubling	EN	D1		
Russula claroflava Grove	Chromgelber Graustieltäubling	VU	B1ab(iv)		
Russula consobrina (Fr.:Fr.) Fr.	Rußgrauer Täubling	VU	D1		
Russula cremeoavellanea Singer	Freudiger Täubling	EN	D1		
Russula cuprea Krombh.	Scharfer Kupfer-Täubling	VU	B1ab(iii,iv)		
Russula curtipes F.H. Moeller & Jul. Schaeff.	Kurzstieliger Ledertäubling	VU	D1		
Russula cutedracta Cooke	Rissiger Zinnober-Täubling	NT			
Russula dryadicola Felln. et Landa	Silberwurz-Täubling	EN	D1		alpine Art bei Silberwurz
Russula elaeodes (Bres.?) Rom.	Hellgrüner Heringstäubling	VU	D1		
Russula emeticicolor (Jul. Schaeff.) Singer	Kleiner Zinnobertäubling	EN	D1		
Russula faginea Romagn.	Buchen-Heringstäubling	VU	B1ab(iii,iv)		
Russula fuscorubra (Bres.) Singer	Braunroter Täubling	VU	D1		
Russula galochroa Fr.	Cremeweißer Täubling	CR	D1		
Russula gracillima J. Schaeff.	Zierlicher Birken-Täubling	NT			Rückgangstendenz
Russula graveolens Romell	Violettlicher Heringstäubling	EN	D1		
Russula griseascens (Bon et Gaugue) L. Marti	Grauender Speitäubling	VU	D1		Moorränder
Russula lilacea Quel.	Violettrossiger Frauentäubling	EN	D1		
Russula livescens (Batsch) Quel.ss. Bres.	Kamm-Täubling	VU	B1ab(iii,iv)		
Russula lundellii Singer	Pracht-Täubling	EN	D1		Art der Südalpen
Russula maculata Quel.et Roz.	Gefleckter Täubling	VU	B1ab(iii,iv)		
Russula medullata Romagn.	Falscher Frauen-Täubling	VU	D1		
Russula melliolens Quel.	Honig-Täubling	VU	D1		
Russula melzeri Zvara	Roter Samt-Täubling	EN	D1		Letzte Fundmeldung 1992
Russula minutula Velen.	Kleiner Rosa-Täubling	NT			
Russula odorata Romagn.	Duftender Täubling	EN	D1		
Russula pallidospora (Blum) Romagn.	Gelbblättriger Täubling	EN	D1		
Russula pectinata (Bull.:St.-Am.) Fr. ss.Singer	Schärflcher Kamm-Täubling	EN	B1ab(iv)+D1		
Russula persicina Krombh.	Schwachfleckender Täubling	VU	B1ab(iii,iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Russula postiana</i> Romell	Grünverfärbender Täubling	VU	D1		
<i>Russula pseudointegra</i> Arnoult et Goris	Ockerblättriger Zinnobertäubling	VU	D1		
<i>Russula roseipes</i> Secr.ss. Bres.	Rosastieliger Täubling	EN	D1		
<i>Russula rubra</i> (Lamb.ex Fr.) Fr.ss.Bresadola	Scharfer Zinnobertäubling	EN	D1		
<i>Russula sororia</i> (Fr.) Romell ss.Boud., Romagn.	Großer Kamm-Täubling	EN	D1		
<i>Russula subfoetens</i> W.G.Smith	Gilbender Stink-Täubling	VU	B1ab(iii)		
<i>Russula taeniospora</i> Einhell.	Karminroter Täubling	VU	D1		
<i>Russula urens</i> Romell ap. Maire ex Singer	Scharfer Grüntäubling	VU	D1		
<i>Russula velenovskyi</i> Melzer et Zwara	Ziegelroter Täubling	VU	D1		
<i>Russula velutipes</i> Velen.	Rosen-Täubling	NT			
<i>Russula versicolor</i> J. Schaeff.	Vielfarbiger Täubling	VU	B1ab(iv)		
<i>Russula veterosa</i> Fr.	Scharfer Honigtäubling	EN	D1		
<i>Russula vinosobrunnea</i> (Bres.) Romagn.	Weinbrauner Täubling	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Rutstroemia elatina</i> (Alb. et Schwein.:Fr.) Rehm	Weisstannen-Stromabecherling	VU	B1ab(iv)		Frühling
<i>Sarcodon fennicus</i> (P. Karst.) P. Karst.	Finnischer Stacheling	CR	A4a		Letzte Fundmeldung 1950
<i>Sarcodon fuligineoviolaceus</i> (Kalchbr.ap.Fr.) Pat.	Brennender Stacheling	VU	D2		
<i>Sarcodon glaucopus</i> Maas-Geest. et Nannf.	Blaufüßiger Stacheling	VU	B1ab(iii)		Warum keine Funde im Mittel-land?
<i>Sarcodon joeides</i> (Pass.) Bat.	Blaufleischiger Stacheling	EN	B1ab(iii,iv)	§ ^{CH}	Laubwald, zeitlicher Rückgang
<i>Sarcodon leucopus</i> (Pers.) Maas-Gest. et Nannf.	Widerlicher Stacheling	EN	B1ab(iii,iv)		Wald-Sonderstandort
<i>Sarcodon martioflavus</i> (Snell et al.apud Snell et Dick) Maas-Geest.	Orangefüßiger Stacheling	VU	D2		
<i>Sarcodon scabrosus</i> (Fr.) P. Karst.	Gallen-Stacheling	VU	B1ab(iii,iv)		Bei Tanne
<i>Sarcodon versipellis</i> (Fr.) Quel.	Orangebrauner Stacheling	VU	B1ab(iii)		Voralpen
<i>Sarcodontia crocea</i> (Schwein.: Fr.) Kotlaba	Krustenförmiger Stachelbart	EN	B1ab(iii)		an alten Apfelbäumen
<i>Sarcoleotia globosa</i> (Sommerf.:Fr.)Korf	Kugeliger Gallertkopf	VU	D1		alpine Art, sandige Gletschervorfelder
<i>Sarcoleotia turficola</i> (Boud.) Dennis	Zweifarbiger Gallertbecher	EN	D1		In Mooren
<i>Scleroderma fuscum</i> (Corda) Fischer	Rotbrauner Hartbovist	EN	D1		
<i>Scleroderma polyrhizum</i> Gmel.ex Pers.	Starkwurzelnder Hartbovist	CR	D1		nur aus dem Tessin nachgewiesen
<i>Scleroderma verrucosum</i> (Bull.) ex Pers.	Braunwarziger Kartoffelbovist	VU	B1ab(iii)		
<i>Scutellinia mirabilis</i> Dissing et Sivertsen	Wunder-Schildborstling	VU	D1		
<i>Scutellinia nigrohirtula</i> (Svcrek) LeGal	Rauhhaariger Schildborstling	VU	D1		
<i>Scutellinia paludicola</i> (Boud.) LeGal	Sumpf-Schildborstling	VU	D1		
<i>Scutellinia setosa</i> (Nees:Fr.) O. Kuntze	Glattsporiger Schildborstling	VU	D1		
<i>Scutigera cristatus</i> (Pers.: Fr.) Kotl. et Pouzar	Grüner Kammporling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Scutigera pescaprae</i> (Pers.: Fr.) Bond. et Singer	Ziegenfuß-Porling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Sebacina dimitica</i> Oberw.	Dimitische Wachskruste	VU	D1		
<i>Sericeomyces serenus</i> (Fr.) Heinem.	Seidenschirmling	VU	D1		xerotherme Standorte
<i>Sericeomyces sericatus</i> (K. et R.) Heinem.	Weisser Seidenschirmling	EN	D1		
<i>Simocybe centunculus</i> (Fr.) Singer	Buchen-Schnitzling	NT			
<i>Simocybe laevigata</i> (J. Favre) P.D. Orton	Olivschnitzling	EN	B1ab(iii)+C2a(i)		Flachmoore
<i>Simocybe reducta</i> (Fr.) Karst.	Bernsteinfüßiger Schnitzling	EN	B1ab(iv)		
<i>Simocybe rubi</i> (Berk.) Singer	Ästchen-Schnitzling	VU	B1ab(iv)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Simocybe sumptuosa</i> (Orton) Singer	Großsporiger Buchen-Schnitzling	VU	D1		
<i>Sistotrema confluens</i> Pers.:Fr.	Kreiselförmiger Schütterzahn	EN	B1ab(iv)		am Boden auf Moosen, abgefallenen Blättern
<i>Skeletocutis lilacina</i> A. David & Jean Keller (1984)	Lilafarbener Korpelporling	CR	D1		
<i>Sowerbyella imperialis</i> (Peck) Korf	Orangefarbiger Wurzelbecherling	VU	B1ab(iv)		Frühlingspilz
<i>Sowerbyella radiculata</i> (Sow.:Fr.) Nannf.	Ockergelber Wurzelbecherling	VU	D1		
<i>Spathularia neesii</i> Bres.	Iedergelber Spateling	EN	B1ab(iv)		im Nadelstreu
<i>Spongipellis pachyodon</i> (Pers.) Kotl.et Pouz.	Breitstacheliger Schwammporling	VU	B2ab(iv)		
<i>Spongipellis spumeus</i> (Sow.ex Fr.) Pat.	Laubholz-Schwammporling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Spongiporus balsameus</i> (Peck) David	Wohlrüchender Saftporling	EN	B1ab(iv)		
<i>Squamanita odorata</i> (Cool) Bas.	Duftender Schuppenwulstling	CR	D1		im urbanen Raum
<i>Squamanita paradoxa</i> (Smith et Singer) Bas	Goldstiel-Schuppenwulstling	CR	D1		im urbanen Raum
<i>Squamanita schreieri</i> Imbach	Gelber Schuppenwulstling	EN	B1ab(iii,iv)+D1	§ ^{CH}	Auenwälder
<i>Steccherinum bourdotii</i> Saliba et J.C. David	Kleinsporiger Resupinatstacheling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)+D1		Südalpenpilz?
<i>Steccherinum dichroum</i> ss.Boud. et Galzin	Zweifarbiger Resupinatstacheling	EN	B1ab(iv)+D2		
<i>Steccherinum oreophilum</i> Linds. et Gilberts	Berg-Resupinatstacheling	VU	D1		
<i>Stephanospora caroticolor</i> (Berk.) Pat.	Karottentrüffel	NT			als Hypogäe untervertreten, aber gut kenntlich Art
<i>Stigmatolemma conspersum</i> (Pers.ex Fr.) Donk	Tannen-Stromabecherchen	EN	D1		an Tannenholz
<i>Stigmatolemma urceolatum</i> (Wallr.:Fr.) Donk	Napfförmiges Stromabecherchen	VU	D2		morsches Holz
<i>Stropharia albocyanea</i> (Desm.) Quel.	Blauer Träuschling	VU	B1ab(iii)		Grasland
<i>Stropharia hornemannii</i> (Weinm.:Fr.) Lund. et Nannf.	Üppiger Träuschling	CR	D1		
<i>Stropharia melasperma</i> (Bull.ex Fr.) Quel.	Schwarzblättriger Träuschling	VU	B1ab(iv)+D1		gedüngte Standorte
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) Singer	Moor-Röhrling	EN	B2ab(iv)		in Flach- und Hochmooren bei Föhren
<i>Suillus plorans</i> (Roll.) Singer	Zirbenröhrling	VU	B1ab(iii)	§ ^{CH}	
<i>Suillus sibiricus</i> Singer	Beringter Zirbenröhrling	VU	B1ab(iii)		
<i>Tapesia rosae</i> (Pers.) Fuckel	Rosen-Filzbecherchen	VU	D1		
<i>Tectella patellaris</i> (Fr.) Murr.	Klebriger Schleierseitling	EN	D1		an Laubholz, insbesondere Erle
<i>Tephrocycbe admissa</i> (Britzelm.)	Glasigers Graublatt	VU	D1		
<i>Tephrocycbe ambusta</i> (Fr.) Donk	Spitzhütiges Kohlen-Graublatt	NT			An Brandstellen
<i>Tephrocycbe mephitica</i> (Fr.)	Kleinsporiges Graublatt	EN	D1		
<i>Tephrocycbe palustris</i> (Peck) Donk	Sumpf-Graublatt	VU	B1ab(iv)		In Schlenken an Sphagnum
<i>Tephrocycbe putida</i> (Fr.) M.M. Moser	Dickfleischiges Graublatt	VU	D1		
<i>Tephrocycbe tylicolor</i> (Fr.) M.M. Moser	Geriefter Graublattrübling	NT			
<i>Thelephora anthocephala</i> (Bull.:Fr.) Pers.	Blumenartige Lederkoralle	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Thuemenidium atropurpureum</i> (Batsch) O.Kuntze	Schwarzrote Blasssporerdzunge	VU	D1		
<i>Tomentella subclavigera</i> Litsch.	Keulenzystiden-Filzgewebe	VU	D1		rar aber weit verbreitet
<i>Trechispora confinis</i> (Bourdot et Galzin) Liberta	Stachelporling	VU	D1		nur Tessin
<i>Trechispora fastidiosa</i> (Pers.:Fr.) Liberta	Stinkender Stachelsporling	VU	D1		ev eine südeuropäische Art auf Kalkböden, terrestrisch Lebensweise
<i>Trechispora microspora</i> (P. Karst.) Liberta	Rundsporiger Stachelsporling	VU	B1ab(iv)+B2ab(iv)		weit verbreitet aber nicht häufig
<i>Trechispora praefocata</i> (Bourdot et Galzin) Liberta	kristallreicher Stachelsporling	VU	D1		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Trechispora stellulata</i> (Bourdot et Galzin) Liberta	langstacheliger Stachelsporling	VU	D1		
<i>Trechispora sulphurea</i> (Pers.: Fr.) Liberta	Schwefelgelber Rindenpilz	VU	B1ab(iv)		
<i>Trichoglossum hirsutum</i> (Pers.:Fr.) Boud.	Behaarte Erdzunge	NT			Feuchtwiesen, Moorart
<i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.:Fr.) Quel.	Gerippter Ritterling	VU	B1ab(iii,iv),+B2ab(iv)		
<i>Tricholoma apium</i> Jul. Schaeff.	Sellerie-Ritterling	CR	D1		
<i>Tricholoma arvense</i> Bon	Orangebrauner Ritterling	EN	B1ab(iii,iv)+2ab(iv)		
<i>Tricholoma bresadolianum</i> Clemencon	Bitterer Buchen-Ritterling	EN	B1ab(iii,iv)		bei Buchen
<i>Tricholoma caligatum</i> (Viv.) Ricken	Krokodil-Ritterling	VU	B1ab(iii,iv)	§ ^{CH}	
<i>Tricholoma cingulatum</i> (Fr.) Jacobasch	Beringter Erdritterling	NT			Abnahme?
<i>Tricholoma colossus</i> (Fr.) Quel.	Riesenritterling	EN	B1ab(iii)+D1	§ ^{CH}	bei Föhren
<i>Tricholoma focale</i> (Fr.) Ricken	Orangebrauner Halsbandritterling	EN	B1ab(iii,iv)+D1		
<i>Tricholoma fucatum</i> (Fr.) Sacc.non ss.Ricken	Olivgrüner Ritterling	VU	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Tricholoma inocybeoides</i> Pearson	Spitzgebuckelter Ritterling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iii)		bei Birken, auch in Parks
<i>Tricholoma inodermeum</i> (Fr.) Gillet	Rissigfädiger Ritterling	EN	B1ab(iv)+D1		in Nadelwäldern auf Kalk, sehr selten
<i>Tricholoma luridum</i> (Schff.ex Fr.) Quel.	Graublättriger Ritterling	NT			
<i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.) Quel.	Getropfter Ritterling	VU	D1		
<i>Tricholoma roseoacereum</i> Bon et Riva	Gerippter Rosa-Ritterling	EN	D1		bei Kastanien, Buchen der Birken
<i>Tricholoma stans</i> (Fr.) Sacc.	Rotfleckendender Kiefern-Ritterling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Tricholoma sudum</i> (Fr.) Quel.	Falbgrauer Ritterling	EN	D1		seltene Art der Nadelwälder
<i>Tricholoma sulphurescens</i> Bres.	Salziger Ritterling	VU	D1		auf kalkreichen Böden bei Laubbäumen, auch in Parkanlagen
<i>Tricholoma triste</i> (Scop.ex Fr.) Quel.	Rußstieler Erdritterling	VU	D1		Nadelwälder, selten
<i>Tricholoma ustaloides</i> Romagn.	Bitterer Eichen-Ritterling	VU	B1ab(iii,iv)		
<i>Tricholoma viridifucatum</i> Bon	Grünfarbiger Ritterling	VU	D1		
<i>Tricholomopsis flammula</i> Metrod	Kleiner Holzritterling	VU	D2		
<i>Tricholomopsis ornata</i> (Fr.) Singer	Rostschuppiger Holzritterling	VU	D1		
<i>Trichophaea abundans</i> (Karsten) Boud.	Rundlicher Borstling	NT			
<i>Trichophaea hemisphaerioides</i> (Mouton) Graddon	Halbkugeliger Borstling	NT			
<i>Trichophaeopsis paludosa</i> (Boud.) Haeffner et L.G. Krieglst.	Sumpfborstling	VU	D1		
<i>Tubaria confragosa</i> (Pers.) Kuehner (1969)	Beringter Trompetenschnitzling	VU	D2		
<i>Tubaria dispersa</i> (Pers.) Singer	Gelblättriger Trompetenschnitzling	VU	D2		dürfte von den Heckenaktionen und den aufgelichteten Waldrändern profitieren, sehr spezialisierte Art, bei Weissdorn
<i>Tubaria pallidispora</i> J.E. Lange	Blaßsporiger Trompetenschnitzling	VU	B1ab(iv)		
<i>Tubaria praestans</i> (Romagn) Moser	Ansehnlicher Trompetenschnitzling	EN	B1ab(iv)		
<i>Tuber borchii</i> Vittad.	Weißliche Trüffel	EN	D1		auch in Parks
<i>Tulasnella eichleriana</i> Bres.	Milchiger Wachskrustenpilz	VU	D1		
<i>Tulostoma brumale</i> Pers.: Pers.	Zitzen-Stielbovist	VU	D1		sandige Böden
<i>Tulostoma fimbriatum</i> Fr.	Bewimperter Stielbovist	VU	B1ab(iii)		

Name		Kat.	Kriterien IUCN	NHV	Bemerkungen
<i>Tulostoma melanocyclum</i> Bres.in Petri	Schwarzgehöfter Stielbovist	CR	D1		xerotherme Standorte
<i>Tulostoma petrii</i> Bres. in Petri	Petris Stielbovist	CR	D1		xerotherme Standorte
<i>Tulostoma squamosum</i> Gmel.ex Pers.	Brauner Stielbovist	EN	B1ab(ii,iii)		sandiger, offener Boden
<i>Tylospora asterophora</i> (Bonord.) Donk	Sternsporiger Warzensporling	VU	D1		
<i>Tyromyces chioneus</i> (Fr.:Fr.) P. Karst.	KurZRöhriger Saftporling	EN	B1ab(iv)		an Laubholz
<i>Tyromyces floriformis</i> (Quél.) Bondartsev & Singer	Rosetten-Saftporling	EN	B1ab(iv)+B2ab(iv)		
<i>Tyromyces placenta</i> (Fr.) Ryvarden	Rosafarbener Saftporling	VU	B1ab(iv)+C2a(i)		
<i>Urnula craterium</i> (Schwein.) Fr.	Schwarzer Kelchpilz	CR	D1		
<i>Uthatabasidium fuisporum</i> (Schroet.) Donk	Spindelsporiger Hydrabasidienpilz	NT			
<i>Veluticeps abietina</i> (Pers.:Fr.) Hjortstam et Telleria	Tannen-Buckelchenschichtpilz	NT			nur im Tessin
<i>Verpa bohemica</i> (Krombholz) Schroeter	Böhmische Verpel	VU	B1ab(iii,iv)		Auenwälder
<i>Verpa conica</i> (Timm: Fr.) Swartz	Fingerhut-Verpel	NT		§ ^{CH}	Frühlingspilz, sandige Böden
<i>Volvariella bombycina</i> (Pers.:Fr.) Singer	Wolliger Scheidling	EN	B1ab(iv)		an toten Partien alter Laubbäume
<i>Volvariella caesiotincta</i> P.D. Orton	Blaugrauer Scheidling	VU	D1		
<i>Volvariella surrecta</i> (Knapp) Singer	Prasitischer Scheidling	NT			
<i>Volvariella taylori</i> (Berk.) Gillet	Asche-Scheidling	VU	D1		Ruderalstellen, nur Deutschschweiz
<i>Xenasma pruinatum</i> (Pat.) Donk	Mehlige Wachshaut	EN	B1ab(iv)		
<i>Xenasma pulverulentum</i> (Litsch.) Donk	Körnige Wachshaut	VU	D1		
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quel.) Quel.	Aprikosenfarbiger Röhrling	VU	B1ab(iii)		
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	Mährischer Röhrling	EN	B1ab(iii,iv)		
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.:Fr.) Quel.	Schmarotzer-Röhrling	VU	C1a(i)		
<i>Xerocomus porosporus</i> Imler	Falscher Rotfußröhrling	VU	D1		Eventuell verkannt
<i>Xerula caussiei</i> Maire	Schwarzbrauner Wurzelrübling	EN	D1		bei Buchen auf Kalkböden
<i>Xylaria filiformis</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	Fädige Holzkeule	VU	D1		
<i>Xylobolus frustulatus</i> (Pers.:Fr.) P. Karst.	Mosaik-Schichtpilz	VU	D2		an alten Eichen